



Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 100 mg/mL (Cefadroxil Mylan)
Alt. 2 - 3: Pulver till oral suspension 100 mg/mL, späds på vårdenhet

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef användas. Obs annan spädning, se Övrig information.

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt 2 - 3 används.

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2 Pulver till slutvolym 60 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
1 flaska	+		=	100 mg/mL
1 st		30 mL		60 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3 Pulver till slutvolym 100 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
1 flaska	+		=	100 mg/mL
1 st		50 mL		100 mL

Beredningsinstruktion:

Pulvret bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cefadroxil ska användas RESTRIKTIVT för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Afebril urinvägsinfektion

Behandlingen påbörjas innan resistensbesked finns.

Barn över 2 år: 12,5 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

Recidiv av streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 10 dagar

Sårinfektion inkl. utbredd impetigo (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 7 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef oral suspension 500 mg/5 mL användas.

Volym vatten som ska tillsättas skiljer sig från det godkända preparatet:

- för slutvolym 60 mL tillsätts 38 mL sterilt vatten
- för slutvolym 100 mL tillsätts 63 mL sterilt vatten

Vattnet tillsätts i omgångar och flaskan skakas kraftigt mellan omgångarna. När allt vatten är tillsatt ska vätskenivån vara i höjd med övre kanten på markeringslinjen på flasketiketten. Vid behov, för att få vätskenivån i rätt nivå, kan ytterligare vatten tillsättas. Den färdiga suspensionen är hållbar 7 dagar i rumstemperatur eller 14 dagar i kylskåp.





Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

ADMINISTRERINGSSÄTT

Skaka flaskan väl innan varje administrering. Cefadroxil bör tas tillsammans med mat.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Cefadroxil oralt 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	-	0,62 mL	1,25 mL	-
15 mg/kg	-	0,75 mL	1,5 mL	-
max 500 mg	-	-	-	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cefadroxil (registrerad produkt)

100 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Efter beredning hållbar 14 dagar i kylskåp.

1 flaska, Pulver till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt. Gäller båda flaskstorlekarna.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan2.janusinfo.se/20201/Infektioner/>

Micromedex

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4821

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-16

ePedID: 4821

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-17

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT