



# Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 100 mg/mL (Cefadroxil Mylan)  
Alt. 2 - 3: Pulver till oral suspension 100 mg/mL, späds på vårdenhet

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef användas. Obs annan spädning, se Övrig information.

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt 2 - 3 används.

## EN-STEGSSPÄDNING

### Alt. 2 Pulver till slutvolym 60 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
1 flaska				<b>100 mg/mL</b>
1 st	+	30 mL	=	60 mL

## EN-STEGSSPÄDNING

### Alt. 3 Pulver till slutvolym 100 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
1 flaska				<b>100 mg/mL</b>
1 st	+	50 mL	=	100 mL

### Beredningsinstruktion:

Pulvret bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

## ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cefadroxil ska användas RESTRIKTIVT för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

### Urinvägsinfektion utan feber

Behandlingen påbörjas innan resistensbesked finns.

Barn över 2 år: 12,5 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

### Recidiv av streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 10 dagar

### Sårinfektion inkl. utbredd impetigo (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 7 dagar

## ÖVRIG INFORMATION

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef oral suspension 500 mg/5 mL användas.

Volym vatten som ska tillsättas skiljer sig från det godkända preparatet:

- för slutvolym 60 mL tillsätts 38 mL sterilt vatten
- för slutvolym 100 mL tillsätts 63 mL sterilt vatten

Vattnet tillsätts i omgångar och flaskan skakas kraftigt mellan omgångarna. När allt vatten är tillsatt ska vätskenivån vara i höjd med övre kanten på markeringslinjen på flasketiketten. Vid behov, för att få vätskenivån i rätt nivå, kan ytterligare vatten tillsättas. Den färdiga suspensionen är hållbar 7 dagar i rumstemperatur eller 14 dagar i kylskåp.





# Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Skaka flaskan väl innan varje administrering. Cefadroxil bör tas tillsammans med mat.

Oralt

Enteralt i sond

## RIMLIG DOS för Cefadroxil oralt 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	-	0,62 mL	1,25 mL	-
15 mg/kg	-	0,75 mL	1,5 mL	-
max 500 mg	-	-	-	5 mL

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Cefadroxil (registrerad produkt)

1 flaska, Pulver till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt. Gäller båda flaskstorlekarna.

100 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Efter beredning hållbar 14 dagar i kylskåp.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan2.janusinfo.se/20211/Infektioner/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4821](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4821)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-04-09

ePedID: 4821

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-04-14

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-04-14

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**