



# Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 100 mg/mL (ex Cefadroxil Mylan)

Alt. 2 - 3: Pulver till oral suspension 100 mg/mL, späds på vårdenhet

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef användas. Obs annan spädning, se Övrig information.

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt 2 - 3 används.

## INGEN SPÄDNING

### Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL SUSP  
100 mg/mL  
60 mL

## EN-STEGSSPÄDNING

### Alt. 2 Pulver till slutvolym 60 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
	+		=	100 mg/mL
1 flaska		30 mL		60 mL

## EN-STEGSSPÄDNING

### Alt. 3 Pulver till slutvolym 100 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
	+		=	100 mg/mL
1 flaska		50 mL		100 mL

### Beredningsinstruktion:

Pulvret bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

## ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cefadroxil ska användas RESTRIKTIVT för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

### Urinvägsinfektion utan feber

Behandlingen påbörjas innan resistensbesked finns.

Barn över 2 år: 12,5 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 5 dagar

### Recidiv av streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 10 dagar

### Sårinfektion inkl. utbredd impetigo (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: 7 dagar

## ÖVRIG INFORMATION

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef oral suspension 500 mg/5 mL användas. Volym vatten som ska tillsättas skiljer sig från det godkända preparatet:

- för slutvolym 60 mL tillsätts 38 mL sterilt vatten
- för slutvolym 100 mL tillsätts 63 mL sterilt vatten

Vattnet tillsätts i omgångar och flaskan skakas kraftigt mellan omgångarna. När allt vatten är tillsatt ska vätskenivån vara i höjd med övre kanten på markeringslinjen på flasketiketten. Vid behov, för att få vätskenivån i rätt nivå, kan ytterligare vatten tillsättas. Den färdiga suspensionen är hållbar 7 dagar i rumstemperatur eller 14 dagar i kylskåp.





## Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

### ADMINISTRERING

Skaka flaskan väl innan varje administrering. Cefadroxil bör tas tillsammans med mat.

Oralt

Enteralt

### RIMLIG DOS för Cefadroxil oralt 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	-	0,62 mL	1,25 mL	-
15 mg/kg	-	0,75 mL	1,5 mL	-
max 500 mg	-	-	-	5 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Cefadroxil (registrerad produkt)

Pulver till oral suspension

Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt. Gäller båda flaskstorlekarna.

100 mg/mL, Oral suspension

Efter beredning hållbar 14 dagar i kylskåp.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4821](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4821)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4821

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-04-25

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**