



Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL

(Ocrevus)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av infusionskoncentrat Ocrevus 300 mg
 Alt. 1: Spädning av dos 300 mg
 Alt. 2: Spädning av dos 600 mg

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 1

Okrelizumab		NaCl 9 mg/mL		INF
300 mg	+		=	1,2 mg/mL
1 st		250 mL		250 mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Okrelizumab		NaCl 9 mg/mL		INF
300 mg	+		=	1,2 mg/mL
2 st		500 mL		500 mL

Beredningsinstruktion:

Skaka inte flaskan med infusionskoncentratet.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Infusionsrelaterade reaktioner (IRR) kan uppkomma under vilken infusion som helst, men har varit mest frekventa under den första infusionen. Reaktioner kan uppkomma inom 24 tim efter infusionen.

Patienten ska premedicineras för att minska frekvens och svårighetsgrad av IRR. Dessutom ska lämpliga åtgärder för hantering av svåra reaktioner (IRR och/eller allergisk reaktion) finnas tillgängliga i samband med infusionen.

Skovvis multipel skleros (RMS)

Tidig primärprogressiv multipel skleros (PPMS)

Barn:

Startdos: 600 mg

Ges som två separata infusioner, 300 mg per tillfälle, med 2 veckors mellanrum.

Underhållsdos: 600 mg

Ges var 6:e månad. Den första underhållsdosen ges 6 månad efter den 1:a infusionen av startdosen. Det minsta intervallet mellan två doser bör vara 5 månader.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-06-17

ePedID: 4822

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-06-19

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-06-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL

(Ocrevus)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Innan infusionen startas bör lösningen ha antagit rumstemperatur. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

Intravenös infusion:

Startdos 600 mg (2 x 300 mg): infusionen startas på 30 mL/tim i 30 min, därefter kan infusionshastigheten ökas i steg med 30 mL/tim var 30:e min till max 180 mL/tim. Varje infusion ska ges under ca 2,5 tim.

Efterföljande doser (600 mg): infusionen startas på 40 mL/tim i 30 min, därefter kan infusionshastigheten ökas i steg med 40 mL/tim var 30:e min till max 200 mL/tim. Varje infusion ska ges under ca 3,5 tim.

Patienten ska övervakas under infusionen och minst 1 timme efter avslutad infusion. Puls och blodtryck ska kontrolleras.

Lösningen ska administreras via ett infusionsset med ett 0,2 eller 0,22 mikrometers in-line-filter.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Okrelizumab (registrerad produkt)

300 mg, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp i ytterkartongen, ljuskänsligt. Får ej frysas.

1,2 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, därefter 8 tim i rumstemperatur.