



## Tiamazol oralt 5 mg

(ex Thacapzol) tablett

**Innan behandlingsstart ska Hb, vita blodkroppar, ASAT och ALAT kontrolleras.**

### ARBETSMILJÖ

Möjlig risk för fosterskador, hantera enligt lokal rutin. undvik direktkontakt med läkemedlet, använd handskar.

### ADMINISTRERING

Oralt:

Thacapzol: Tabletten kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge halverad dos.

Tiamazole Uni-Pharma (inkl. parallellimport): Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Tabletten (båda fabrikaten) kan slamas upp i lite vatten precis innan administreringen.

Enteralt:

Slamma upp tabletten i ca 10 mL vatten i en spruta i direkt anslutning till administreringen. Gäller båda fabrikaten.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Tiamazol (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnendokrinolog.

#### Neonatal tyreotoxikos (hypertyreos)

Nyfödda: 0,1 - 0,5 mg/kg x 2

Dygnsdosen kan även fördelas på 3 doseringstillfällen.

Behandlingstid: vid övergående kongenital tyreotoxikos vanligen 1 - 2 mån

#### Tyreotoxikos (hypertyreos)

Barn 1 mån - 18 år:

Initialt 0,05 - 0,25 mg/kg x 2 alternativt 0,1 - 0,5 mg/kg x 1, max 40 mg/dygn

Vid doser under 10 mg/dygn eller vid dålig följsamhet kan hela dygnsdosen tas vid ett tillfälle.

När nivån FT4 tydligt sjunker, vanligen efter 2 - 6 veckor, reduceras dosen med 25 - 50 %. Ytterligare dosreduktion kan bli nödvändig för att undvika utveckling av hypotyreos.

Behandlingstid: vanligen 2 år

### ÖVRIG INFORMATION

Tiamazol benämns metimazol i vissa källor, särskilt i engelskspråkig litteratur. Karbimazol är en pro-drug till tiamazol (inget godkänt läkemedel finns i Sverige).





## Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

PubMed PMID Léger J et al. Graves' disease in children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30180972>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Delförening för endokrinologi och diabetes - Tyreotoxikos

<https://endodiab.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4831](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4831)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-09-10

ePedID: 4831

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2021-09-10

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-09-10

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**