



## Lidokain utvärtes

(Maxilene) kräm

**Ska inte användas till patienter som är överkänsliga mot soja och/eller jordnötter.**

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes: Krämen ska appliceras tjockt på huden och lämnas orörd. Behöver inte täckas med förband för effektens skull, men kan rekommenderas för att förhindra kladd. Innan procedur ska krämen avlägsnas.

Effekten inträder tidigast efter 30 minuter.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Maxilene (registrerad produkt)

40 mg/g, Kräm

HÅLLBAR: Får ej frysas. Hållbarhet öppnad förpackning 6 månader.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Lokalanestetikum inför venkanylering eller venpunktion

Barn 1 - 3 mån: högst 1 gram kräm (motsvarar 3,5 cm från en 30-gramstub) i max 1 timme

Barn 3 - 12 mån: högst 1 gram kräm, max 4 timmar

Barn över 1 år: 1 - 2,5 gram kräm, max 5 timmar

### ÖVRIG INFORMATION

Maxilene innehåller endast lidokain och inte prilokain, därmed minskar risken för methemoglobinemi och kärlkonstriktion.

Krämen innehåller hydrerad sojabönslecitin och ska därför inte användas till patienter som är allergiska mot jordnötter och/eller soja.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Koh et al 2004. A randomized, double-blind comparison study of EMLA and ELA-Max for topical anesthesia in children undergoing intravenous insertion.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15601345>

Rekommendation (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-02-11

ePedID: 4839

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-02-11

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-02-11

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**