



Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL

(Mycamine)

Tvåstegsspädning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: mikafungin 2 mg/mL (extempore)

Alt. 2: spädning från 50 mg

TVÅ-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Steg 1 Mikafungin		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		Stamlösning
50 mg	+	mg/mL	=	10 mg/mL
1 st		5 mL		5 mL

Steg 2 Stamlösning		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INF
10 mg/mL	+	mg/mL	=	2 mg/mL
5 mL		20 mL		25 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt spädningsvätskan långsamt utefter väggen på flaskan med pulvret. Roter flaskan långsamt, SKAKA INTE. Lösningen kommer att skumma, men med rätt handhavande kan skumbildningen minimeras. Även i steg 2 ska lösningen blandas försiktigt utan att skakas för att undvika skumbildning.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Ges under 1 timme. Ska ges i separat infart.

Påsen/flaskan/sprutan ska ljusskyddas under administreringen, slang och eventuell droppkammare behöver inte ljusskyddas.

RIMLIG DOS för Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL
3 mg/kg	-	7,5 mL	15 mL	75 mL
10 mg/kg	5 mL	25 mL	-	-

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Leverfunktionen ska följas noga vid behandling med mikafungin. För patienter med gravt nedsatt leverfunktion eller kronisk leversjukdom bör ett noggrant övervägande av risk/nytta ske innan behandling.

Vid otillräckligt behandlingsvar eller vid misstanke om CNS-infektion bör den högre dosen i intervallen användas.

Invasiv candidiasis

Nyfödda: 4 - 10 mg/kg x 1

Barn 1 - 3 mån: 4 - 10 mg/kg x 1

Barn 4 mån - 18 år, upp till 40 kg: 2 - 4 mg/kg x 1

Barn 4 mån - 18 år, över 40 kg: 100 - 200 mg x 1

Behandlingstid: minst 14 dagar. Behandling bör pågå minst 1 vecka efter två på varandra följande negativa blododlingar och efter att symtomen har försvunnit.

Invasiv aspergillo

Barn 4 mån - 18 år, upp till 40 kg: 1,5 - 3 mg/kg x 1

Barn 4 mån - 18 år, över 40 kg: 100 - 150 mg x 1

Behandlingstid: minst 6 - 12 veckor

Profylax mot invasiv svampinfektion

Nyfödda: 2 mg/kg x 1

Barn 1 - 3 mån: 2 mg/kg x 1

Barn 4 mån - 18 år, upp till 40 kg: 1 mg/kg x 1

Barn 4 mån - 18 år, över 40 kg: 50 mg x 1

Behandlingstid: tills 1 vecka efter att neutrofilnivån är återställd.





Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (Mycamine)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Mikafungin (från registrerad produkt)

50 mg, Pulver till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

10 mg/mL, Stamlösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemp, 24 tim i kylskåp. Skyddas mot ljus. Stamlösningen bör INTE sparas pga förväxlingsrisk. Alternativt ska inte färdigspädd lösning sparas.

2 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemp, 24 tim i kylskåp. Skyddas mot ljus.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-04-14

ePedID: 4842

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-04-15

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT