



Deferasirox oralt

(Exjade) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Dispergerbar tablett 250 mg.
Filmdragerad tablett 90, 180 och 360 mg.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:
Dispergerbara tabletter ska tas en gång per dag på fastande mage, minst 30 minuter före måltid.

Får inte delas. Får inte krossas. Får inte tuggas. Löses i vatten, alternativt äppel- eller apelsinjuice. Lös inte upp tablettorna i kolsyrad dryck eller mjölk. Svälj inte tablettorna hela.

De filmdragerade tablettorna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid.

Filmdragerade tabletter kan krossas och strös över t ex yoghurt. Blandningen ska intas omedelbart.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Exjade (registrerad produkt)

90 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Gäller även övriga styrkor.

250 mg, Dispergerbar tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid byte från filmdragerade tabletter till dispergerbara tabletter, ska dosen av dispergerbara tabletter vara 40 % högre än dosen av filmdragerade tabletter, avrundat till närmaste hela tablett.

Ska ordineras i samråd med hematolog.

Järnöverskott till följd av blodtransfusioner t. ex. vid talassemi major

Dosen justeras utifrån ferritinnivåer och mängd blodtransfusion

Startdos	Rekommenderad	Hög*	Låg ^α
Filmdragerad tablett:	14 mg/kg	21 mg/kg	7 mg/kg
Dispergerbar tablett:	20 mg/kg	30 mg/kg	10 mg/kg

* Högre startdos kan krävas för patienter som kräver reduktion av för höga järnnivåer eller som får höga doser erythrocytkoncentrat (mer än 14 mL/kg/månad).

^α Lägre startdos kan övervägas för patienter som inte har så höga järnnivåer eller som får låga doser erythrocytkoncentrat (inte mer än 7 mL/kg/månad).

Maxdos:

Filmdragerade tabletter 28 mg/kg motsv dispergerbar tablett 40 mg/kg

Järnöverskott vid icke-transfusionsberoende talassemisyndrom

Barn 10 - 18 år:

Startdos

Filmdragerad tablett 7 mg/kg x 1

Dispergerbar tablett 10 mg/kg x 1





Deferasirox oralt

(Exjade) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

För barn i åldern mellan 2 och 5 år är exponeringen lägre än för vuxna. Denna åldersgrupp kan därför behöva högre doser än vad som krävs för vuxna, men den initiala dosen ska vara samma som för vuxna, med efterföljande individuell titrering.

Filmdragerade tabletter har uppvisat högre biotillgänglighet jämfört med dispergerbara tabletter, därav dosskillnaden mellan de olika beredningsformerna.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicines for children Leaflet information Deferasirox for removing excess iron

<https://www.medicinesforchildren.org.uk/deferasirox-removing-excess-iron-0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Vårdplaneringsgruppen för pediatrik hematologi: Thalassemi och kronisk blodtransfusion

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-wardplaneringsgruppen-for-pediatrik-hematologi/wardprogram-vph/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-06-09

ePedID: 4846

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-24

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-06-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT