



Deferasirox oralt

(ex Exjade) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerade tabletter 90, 180 och 360 mg

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid. Kan krossas och strös över t ex yoghurt. Blandningen ska intas omedelbart.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Deferasirox (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras i samråd med hematolog.

Järnöverskott till följd av blodtransfusioner t. ex. vid talassemia major

Dosen justeras utifrån ferritinnivåer och mängd blodtransfusion

	Rekommenderad	Hög*	Låg ^a
Startdos	14 mg/kg	21 mg/kg	7 mg/kg

* Högre startdos kan krävas för patienter som kräver reduktion av mycket höga järnnivåer eller som får höga doser erytrocytkoncentrat (mer än 14 mL/kg/månad).

^a Lägre startdos kan övervägas för patienter som inte har så höga järnnivåer eller som får låga doser erytrocytkoncentrat (inte mer än 7 mL/kg/månad).

Maxdos: 28 mg/kg

Järnöverskott vid icke-transfusionsberoende talassemisyndrom

Barn 10 - 18 år: 7 mg/kg x 1

ÖVRIG INFORMATION

För barn i åldern mellan 2 och 5 år är exponeringen lägre än för vuxna. Denna åldersgrupp kan därför behöva högre doser än vad som krävs för vuxna, men den initiala dosen ska vara samma som för vuxna, med efterföljande individuell titrering.

För att minimera risken för njurskada bör njurfunktionen skattas genom GFR-mätning innan behandlingsstart, varje vecka under den första månaden av behandlingen och vid ändrad behandlingsdos.

För att minimera risken för leverskada bör leverfunktionen följas upp genom att följa upp serumtransaminaser, bilirubin och alkaliskt fosfat innan behandlingsstart, varannan vecka under första månaden av behandlingen och därefter varje månad.





Deferasirox oralt

(ex Exjade) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicines for children Leaflet information Deferasirox for removing excess iron

<https://www.medicinesforchildren.org.uk/deferasirox-removing-excess-iron-0>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Thalassemi och kronisk blodtransfusion

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-wardplaneringsgruppen-for-pediatrisk-hematologi/wardprogram-vph/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4846

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-04-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT