



Atomoxetin oralt 4 mg/mL

(Strattera) oral lösning

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
4 mg/mL
 100 mL

ADMINISTRERING

Atomoxetin tas som en singeldos på morgonen. Vissa patienter kan ha nytta av att dela upp dosen i en morgondos och en dos sent på eftermiddagen alt. tidigt på kvällen.

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Atomoxetin oralt 4 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	-	-	-	6,25 mL
1,2 mg/kg	-	-	-	15 mL
1,8 mg/kg, max 80 mg	-	-	-	20 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Atomoxetin (registrerad produkt)

4 mg/mL, Oral lösning

Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning är hållbar i 45 dagar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling bör inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller barnmedicin.

Atomoxetin interagerar starkt med flera läkemedel, se Övrig information.

ADHD, monoterapi eller tilläggsbehandling

Barn från 6 år och under 70 kg:

Startdos 0,5 mg/kg x 1, ges i 1 - 2 veckor

Öka därefter dosen till underhållsdos 1,2 mg/kg x 1.

I vissa fall kan doser upp till 1,8 mg/kg/DYGN ges, observera att för doser över 1,2 mg/kg är evidensen låg för effekt på ADHD-symtomen.

Maxdos: 1,8 mg/kg/DYGN, dock max 80 mg/DYGN

Barn från 70 kg:

Startdos 40 mg x 1, ges i 1 - 2 veckor (10 mL)

Öka därefter dosen till underhållsdos 60 - 100 mg x 1 efter kliniskt behov.

Maxdos: 100 - (120) mg/DYGN

Uppföljning av klinisk effekt bör ske tätare under de första sex månaderna.

Därefter minst var sjätte månad. Den långsiktiga nyttan ska regelbundet omvärderas.



Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning



ÖVRIG INFORMATION

Hos patienter med missbruk/risk för missbruk kan atomoxetin vara förstahandsval vid behandling av ADHD.

Atomoxetin kan påverka blodtryck och hjärtfrekvens. Dokumentera puls och blodtryck inför insättning av atomoxetin och därefter regelbundet efter varje dosökning och minst var sjätte månad.

Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel i samband med behandling med atomoxetin. Därför ska detta läkemedel inte ges vid kända allvarliga kardiella defekter, kardiomyopati, allvarliga hjärtrymrubbningar eller andra allvarliga hjärtproblem.

Kramper kan utlösas vid behandling med atomoxetin, försiktighet bör iaktas hos patienter med känd benägenhet för kramper. Vid nytillkomna eller förvärrade kramper ska därför läkemedlet sättas ut.

Vikt och längd ska följas under behandling då atomoxetin har förknippats med långsammare viktökning och minskad slutlängd.

Interaktioner att beakta

- Atomoxetin interagerar starkt med MAO-hämmare, ett 2 veckors medicinfritt intervall krävs mellan behandlingarna.
- Vid samtidig behandling med fluoxetin bör dosen av atomoxetin halveras då båda läkemedlen metaboliseras av CYP2D6. Kombinationen kan leda till flerfaldig ökning av plasmakoncentrationen av atomoxetin.
- Dosen för atomoxetin bör titreras upp långsamt med en lägre måldos vid samtidig behandling med andra läkemedel som är starka hämmare av CYP2D6.



Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2023 - Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/494342/contentassets/c5b865fe86d44fbd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm.pdf>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ADHD, 2016

<https://sfb.se/sfbup/riktlinjer/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnkardiologisk Förening - ADHD/centralstimulantia - råd & rekommendationer: Vårdprogram för barnkardiologisk övervakning vid läkemedelsbehandling av barn och ungdomar med ADHD

<https://sbkf.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRAL

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4854

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-08-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT