



Hydroxizin oralt

(ex Atarax) tabletter

Hög risk för biverkningar, se Övrig information

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 10 och 25 mg (ex Atarax)

Hydroxizin finns även som oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: De flesta tabletter på 25 mg har en brytskåra som möjliggör att tablettens kan delas i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se FASS.

Enteralt i sond: Använd oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hydroxizin (ex Atarax) (registrerad produkt)

10 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur. Enligt företaget är Atarax tabletter ljuskänsliga, denna information anges inte för övriga tillverkare. Gäller även för styrkan 25 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Ångest och oro (off label)

Barn 5 - 18 år: 10 - 25 mg x 3

Maxdos

Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN

Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN

Sömnstörning (off label)

Barn 5 - 11 år: 10 - 25 mg x 1, till kvällen

Barn 12 - 18 år: 25 - 50 mg x 1, till kvällen

Maxdos

Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN

Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN

ÖVRIG INFORMATION

Hydroxizin är en H1 receptorantagonist och har en central verkan på formatio reticularis, vilket påverkar bl.a. medvetande och vakenhet. Hydroxizin har också en antikolinerg, spasmolytisk och adrenolytisk verkan. Yngre barn är mer benägna att få biverkningar relaterade till centrala nervsystemet jämfört med vuxna. Krampanfall har rapporterats mer frekvent för barn än för vuxna.

Risk för hangover-effekt, kvarstående sedering och förlängd QT-tid.

Samtidig användning av hydroxizin och alkohol ska undvikas eftersom kombinationen kan förstärka effekterna av hydroxizin.

För hydroxizin finns godkänd indikation urtikaria och klåda för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för hydroxizin. Därför finns inte indikationen urtikaria och klåda med på denna barnläkemedelsinstruktion.



Hydroxizin oralt

(ex Atarax) tabletter



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

<https://lv.se/neuroleptikatillbarn>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn

<https://lv.se/somnstorningarhosbarn>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-11-27

ePedID: 4857

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-11-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-11-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT