



## Oxazepam oralt

(ex Sobril) tabletter

**Risk för tillvänjning och paradoxala reaktioner hos barn.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5, 10, 15 och 25 mg (ex Sobril)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Oxazepam (ex Sobril) (registrerad produkt)**

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 10, 15 och 25 mg.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Kraftig ångest och oro (3:e handsval)

Endast för kortvarig behandling och användning i slutenvård. Rekommenderas endast i undantagsfall och inte i öppenvård. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnneurologi eller barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år: 5 - 10 mg vid behov, alternativt 5 - 10 mg x 3 - 4

### ÖVRIG INFORMATION

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel bör generellt undvikas som sederande läkemedel. Det föreligger risk för tolerans och beroendeutveckling.

Evidens saknas vad gäller behandlingseffekt och besodiazepiner är inte godkända för behandling av sömnstörning hos barn och ungdomar.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn

<https://lv.se/somnstorningarhosbarn>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-06-05

ePedID: 4859

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-06-05

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-06-05

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**