



Oxazepam oralt

(ex Sobril) tabletter

Risk för tillvänjning och paradoxala reaktioner hos barn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5, 10, 15 och 25 mg (Oxascand)
Tabletter 10 och 15 mg (Sobril)

ADMINISTRERING

Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge halv dos.
Oralt
Enteralt:
Tabletten kan lösas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oxazepam (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kraftig ångest och oro (3:e handsval)

Endast för kortvarig behandling och användning i slutenvård. Rekommenderas endast i undantagsfall och inte i öppenvård. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnneurologi eller barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år: 5 - 10 mg vid behov, alternativt 5 - 10 mg x 3 - 4

ÖVRIG INFORMATION

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel bör generellt undvikas som sederande läkemedel. Det föreligger risk för tolerans och beroendeutveckling.

Evidens saknas vad gäller behandlingseffekt och bensodiazepiner är inte godkända för behandling av sömnstörning hos barn och ungdomar.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

www.lakemedelsverket.se/somnstorning

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4859

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-06-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT