



Propiomazin oralt 25 mg

(Propavan) tablett

Risk för extrapyramidala symtom samt dagtrötthet.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

För att underlätta nedsväljning kan tablettorna delas. Brytskåran är inte avsedd för att ge halva dosen.

Tabletten kan även krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

Enteralt i sond: Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.

Tabletten ges 30 - 60 min före sänggåendet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Propiomazin (Propavan) (registrerad produkt)

25 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Långvarig insomni (3:e handsval)

Rekommenderas endast i undantagsfall. Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas och behandlingen ska noggrant följas upp av specialist inom barnpsykiatri.

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg, ges 30 - 60 min före sänggåendet.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Instruktion för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling BUP Stockholm 2019

<http://www.sfbup.se/varprogram/instruktion-for-lakemedelsbehandling-bup-stockholm-2019/>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

www.lakemedelsverket.se/somnstorning

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-09-15

ePedID: 4863

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-06

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT