



## Zopiklon oralt 5 mg

(ex Imovane) tablett

**Risk för beroende samt dagtrötthet.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 5 mg (ex Imovane)

### ADMINISTRERING

Oralt

Tabletten ska administreras omedelbart före sänggående.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Zopiklon (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Vissa tillverkare anger att preparatet är fukt känsligt samt ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen, se produktresumé.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Sömnstörningar (3:e handsval)

Rekommenderas endast i undantagsfall vid kortvarig behandling, mindre än 1 vecka, pga risk för beroende. Får aldrig ordineras vid misstanke om missbruksproblematik.

Behandling ska inledas och noggrant följas upp av specialist i barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år (endast efter puberteten): 5 mg x 1, omedelbart före sänggående.

### ÖVRIG INFORMATION

Zopiklon har en halveringstid på 5 - 7 timmar vilket ger risk för dagtrötthet.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

[www.lakemedelsverket.se/somnstorning](http://www.lakemedelsverket.se/somnstorning)

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4866

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-12-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**