



Zopiklon oralt 5 mg

(ex Imovane) tablett

Risk för beroende samt dagtrötthet.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 5 mg (ex Imovane)

ADMINISTRERING

Oralt

Tabletten ska administreras omedelbart före sänggående.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Zopiklon (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 30 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sömnstörningar (3:e handsval)

Rekommenderas endast i undantagsfall vid kortvarig behandling, mindre än 1 vecka, pga risk för beroende. Får aldrig ordineras vid misstanke om missbruksproblematik.

Behandling ska inledas och noggrant följas upp av specialist i barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år (endast efter puberteten): 5 mg x 1, omedelbart före sänggående.

ÖVRIG INFORMATION

Zopiklon har en halveringstid på 5 - 7 timmar vilket ger risk för dagtrötthet.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

www.lakemedelsverket.se/somnstorning

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4866

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-12-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT