



Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL

spädning från Nezeril

EN-STEGSSPÄDNING

Nezeril		NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,25 mg/mL				0,125 mg/mL
0,1 mL	+	0,1 mL	=	0,2 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL direkt i endosbehållaren med Nezeril 0,25 mg/mL.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Nasalt: Administrera läkemedlet direkt från endosbehållaren.

Innan användning av näsdropparna bör barnets näsa rengöras från snor om möjligt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nezeril (registrerad produkt)

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning

HÅLLBAR: Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i 3 månader. Förvara de oöppnade endosbehållarna i sitt innerkuvert.

0,125 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rinit samt avsvällande vid sinuit

Nyfödda (i undantagsfall): 1 droppe i vardera näsborren 3 - 4 gånger/dygn

Barn 1 mån - 2 år: 1 droppe i vardera näsborren 3 - 4 gånger/dygn

ÖVRIG INFORMATION

Använd inte oximetazolin mer än 5 dagar i följd till barn under 2 år, kan ge läkemedelsrelaterad rinit.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Felleskatalogen - Rhinox, SPC

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/rhinox-takeda-563460>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-26

ePedID: 4872

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-03-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-03-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT