



Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL

spädning från Nezeril

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av endospipett 0,25 mg/mL (Nezeril).

Används vid rest av licenspreparat med styrkan 0,1 mg/mL.

EN-STEGSSPÄDNING

Oximetazolin		NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,25 mg/mL				
	+		=	0,125 mg/mL
0,1 mL		0,1 mL		0,2 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL direkt i endosbehållaren med Nezeril 0,25 mg/mL alternativt tom endosbehållarens innehåll (0,1 mL) i en medicinkopp, tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL och sug sedan upp blandningen i den tomma endospipetten och administrera från den.

ADMINISTRERING

Nasalt: Administrera läkemedlet direkt från endosbehållaren.

Administreras 15 min innan måltid.

Innan användning av näsdropparna bör barnets näsa rengöras från snor om möjligt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oximetazolin (registrerad produkt)

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Öppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur. Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,125 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Avsvällande vid nästäppa

Vanligen vid behov

Nyfödda: 1 droppe i vardera näsborre

Barn 1 - 6 mån: 1 - 2 droppar i vardera näsborre

Barn 7 mån - 2 år: 2 - 4 droppar i vardera näsborre

Kan ges max 3 gånger/dygn.

Används högst 7 dagar i rad, kan annars ge läkemedelsrelaterad nästäppa.

ÖVRIG INFORMATION

Avsvällande näsdroppar till barn under 2 år saknar god evidens. Använd koksaltlösning i första hand.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress FDA - Biverkningsrapport

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm325257.htm>

Internetadress Felleskatalogen - Rhinox, SPC

<https://www.felleskatalogen.no/medisin>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress MHRA - Overview, Risk: benefit of OTC cough and cold medicines in children

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/websiteresources/con041374.pdf>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Nasivin 0,1 mg/mL

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-10-25

ePedID: 4872

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-10-26

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-10-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT