



Sotalol oralt

(ex Sotacor) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 40, 80 och 160 mg
Extemporekapslar 1, 5 och 10 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: I första hand rekommenderas användning av oral lösning.
Tabletten kan slammas upp i 10 mL vatten och ges i sonden.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sotalol (registrerad produkt)

160 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även 40 och 80 mg.

Sotalolhydroklorid (extempore - ej lagervara)

5 mg, KAPSLAR

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ventrikulär arytm samt svårbehandlad supraventrikulär arytm

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 2 - 3, ev. successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 2, ev successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Maxdos

Barn 1 mån - 11 år: 80 mg x 2

Barn 12 - 18 år: 160 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Hypokalemi eller hypomagnesi måste korrigeras innan behandling med sotalol, annars finns ökad risk för förstärkt QT-förlängning och torsade de pointes.

Sotalol bör sättas in när patienten är ineliggande med daglig EKG- kontroll. Oftas krävs kontinuerlig EKG-övervakning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2019-05-02

ePedID: 4874

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-05-02

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-05-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT