



Sotalol oralt

(ex Sotacor) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 40 och 80 mg
Kapsel 1 mg (extempore)

ADMINISTRERING

Oralt:

Tabletter Sotacor kan delas i två lika stora doser.

Tabletter Sotalol Viatris kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge en mindre dos.

Mat och mejeriprodukter minskar absorptionen, sotalol bör därför tas 1 - 2 timmar före måltid.

Enteralt:

I första hand rekommenderas användning av oral lösning, se annan instruktion.

Tabletten kan slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

Kapslarnas innehåll bör inte ges enteralt då de innehåller majsstärkelse som kan bilda klumpar och orsaka stopp.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sotalol (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

Sotalolhydroklorid (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras i hela tabletter/kapslar. Vid behov av en annan beredningsform rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

Ventrikulär arytm samt svårbehandlad supraventrikulär arytm

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

Nyfödda:

0,5 - 1 mg/kg x 2 - 3, ev. successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år:

1 mg/kg x 2, ev. successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Maxdos

Barn 1 mån - 11 år: 80 mg x 2

Barn 12 - 18 år: 160 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Hypokalemi eller hypomagnesi måste korrigeras innan behandling med sotalol inleds, annars finns ökad risk för QT-förlängning och torsade de pointes. Sotalol bör sättas in när patienten är inlagd med daglig EKG-kontroll.

Sotalol interagerar med ett flertal andra antiarytmika, exempelvis flekainid och amiodaron, vilket innebär vid kombinationsbehandling en påtaglig risk för förlängd QTc-tid och allvarliga ventrikulära arytmier.

Sotalol oralt

(ex Sotacor) tabletter/kapslar



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

NeoFax

Neonatal Formulary

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 4874

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT