



Adenosin intravenös inj 2,5 mg/mL

(Adenosin Life Medical)

Ges under kontinuerlig EKG-övervakning och utrustning för akut HLR ska finnas tillgänglig.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av Adenosin injektionsvätska. Denna spädning är lämplig för mindre barn. För större barn (förlagsvis över 5 kg) kan ospätt Adenosin användas, se annan läkemedelsinstruktion.

EN-STEGLÄKEMEDEL

Adenosin Life Medical 5 mg/mL 2 mL	+ vatten 2 mL	NaCl 9 mg/mL alt sterilt = 2,5 mg/mL 4 mL	INJ LÖ
------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------	--------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: så snabb injektion som möjligt, 2 sek antingen i central eller stor perifer ven. Följt av snabb flush med NaCl 9 mg/mL.

Använd helst trevägskran, koppla båda sprutorna samtidigt för att kunna flusha Adenosin först och därefter direkt med 2 - 5 mL NaCl 9 mg/mL.

Bör administreras i så hjärtnära ven som möjligt, vanligtvis i armvecket.

RIMLIG DOS för Adenosin intravenös inj 2,5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	0,02 mL	0,1 mL	0,2 mL	1 mL
0,1 mg/kg	0,04 mL	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
0,3 mg/kg	0,12 mL	0,6 mL	1,2 mL	6 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Avbrytande av supraventrikulär takykardi

Adenosin får endast ges i närvaro av läkare och under kontinuerlig EKG-övervakning.

Nyfödda: Startdos 0,1 mg/kg, kan upprepas varannan minut med ökning av dosen med 0,05 mg/kg varje gång till effekt eller maxdos 0,3 mg/kg.

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 0,1 mg/kg (max 6 mg), kan upprepas varannan minut med ökning av dosen med 0,1 mg/kg varje gång till effekt eller maxdos 0,4 mg/kg (max 15 mg).

Nyfödda: Om ej omslag på 0,3 mg/kg, kontakta barnkardiolog.

Barn 1 mån - 18 år: Om ej omslag på 0,4 mg/kg, kontakta barnkardiolog.

Max 0,5 mg/kg.

Om central ven används ska initiala dosen halveras, dvs 0,05 mg/kg (50 mikrogram/kg). Dosen ökas sedan med 0,05 mg/kg.

ÖVRIG INFORMATION

Kontakta barnkardiolog angående dosreduktion, om patienten är hjärttransplanterad.

Adenosin får inte förvaras i kyla då det finns risk för utfällning (kristaller). Om kristaller bildats, värm upp lösningen tills kristallerna löst upp sig.

Hållbarheten skiljer sig från den som är angiven i FASS och grundas på konsultation av andra farmaceutiska källor.

Vanliga biverkningar: hyperventilation, flush, dyspné, tryckkänsla över bröstet, illamående, takykardi och blodtrycksfall.

Kontraindikation: AV-block grad II eller III patienter med lång QT-tid, sick-sinus syndrom.

Kan interagera med koffein och teofyllamin. Dosen kan behöva anpassas.





Adenosin intravenös inj 2,5 mg/mL

(Adenosin Life Medical)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adenosin Life Medical (registrerad produkt)

5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Sparas ej efter första uttag.

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2A)

http://www.essential evidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4877

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-10-24

ePedID: 4877

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-23

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT