



Oxkarbazepin oralt

(Trileptal) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 150 mg, 300 mg och 600 mg

Oxkarbazepin finns även som oral suspension, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att halvera dosen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oxkarbazepin (registrerad produkt)

150 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tabletternas styrka gör att de vid initial behandling är lämpliga att ge till barn från ca 30 kg. Till barn med lägre vikt eller då rätt dosering inte kan erhållas med tabletter rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

Epilepsi med fokala anfall eller generaliserade tonisk-kloniska anfall

Barn 6 - 18 år: Initialt 4 - 5 mg/kg x 2, max 300 mg/DOS

Därefter ökning i steg om max 5 mg/kg x 2 ungefär var 7:e dag utifrån respons.
Vanlig underhållsdos: 15 mg/kg x 2, max 23 mg/kg x 2

Serumkoncentrationsbestämning av den aktiva metaboliten MHD (monohydroxiderivat) är möjlig, terapeutiskt intervall är 40 - 110 mikromol/L.

Risk för hyponatremi. Vid samtidig annan riskfaktor för hyponatremi bör S-Natrium följas.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress VGR, Alfresco - Epileptiska anfall hos barn och ungdomar, ett hjälpmedel för bedömning, diagnostik och behandling

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33901?/a=false&guest=true>

Läkemedelsverket Läkemedelsboken

<https://lakemedelsboken.se/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-04-30

ePedID: 4878

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-30

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT