



Cinakalcet oralt

(ex Mimpara) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 30, 60 och 90 mg (ex Mimpara)

ADMINISTRERING

Biotillgängligheten ökar om det administreras med mat eller direkt efter en måltid.

Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge lägre dos.

Oralt: Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering, alternativt blandas med mjuk mat.

Enteralt: Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. Vid ofullständig krossning kan bitar av dragering leda till stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cinakalcet (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor och fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Serumkalций bör kontrolleras före behandlingsstart samt regelbundet därefter, se Övrig information.

Doser under 30 mg är svårt att ordinera i dagsläget eftersom det är brist på kapslar med lägre styrka, se Övrig information.

Sekundär hyperparatyreoidism med avancerad njurinsufficiens

Barn 1 mån - 18 år: startdos 0,2 mg/kg/DYGN

Dygnsdosen kan titreras upp med 0,2 mg/kg var 2:a till 4:e vecka.
Max 2,5 mg/kg/DYGN, dock max 180 mg/DYGN.

ÖVRIG INFORMATION

Cinakalcet ska inte användas hos patienter med förlängt QT-intervall eller i kombination med andra läkemedel som sänker serumkalцийnivån.

Korrigerat serumkalций ska ligga i den övre delen av, eller över, det åldersspecifierade referensområdet innan den första dosen cinakalcet administreras och därefter monitoreras noga. När underhållsdosen har fastställts rekommenderas kontroll av serumkalцийnivån varje vecka.

Cinakalcet kapslar (1 mg, 2,5 mg och 5 mg) tillhandahålls inte längre.

Cinacalcet oralt

(ex Mimpara) tabletter



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Micromedex

PubMed PMID Bacchetta J et al. Cinacalcet use in paediatric dialysis: a position statement from the European Society for Paediatric Nephrology and the Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorders Working Group of the ERA-EDTA. Nephrol Dial Transplant. 2020 Jan.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31641778>

PubMed PMID Bernardor J et al. Safety and Efficacy of Cinacalcet in Children Aged Under 3 Years on Maintenance Dialysis. Nephrol Dial Transplant. 2024 May.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39081774>

PubMed PMID Lin KY et al. Cinacalcet for Infants and Young Children on Maintenance Dialysis: Determining the Right Time, the Right Dose and the Right Patients. Kidney Int Rep. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40225398>

PubMed PMID Rafif A et al. Cinacalcet use in pediatric chronic kidney disease. Saudi Med J. 2020 May.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32373914>

PubMed PMID Sohn WY et al. An open-label, single-dose study to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of cinacalcet in pediatric subjects aged 28 days to < 6 years with chronic kidney disease receiving dialysis. Pediatr Nephrol, Jan

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30141180>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



Cinakalcet oralt

(ex Mimpara) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 4880

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-05-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT