



Losartan oralt

(ex Cozaar) tabletter

Vid dehydrering/hypovolemi bör ARB* tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad njursvikt och hyperkalemi.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 12,5 , 50 och 100 mg (ex Cozaar)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

För att underlätta nedsväljning kan tablettarna krossas och slammas upp i 10 mL vatten för omedelbar administrering. Den aktiva substansen har en bitter smak.

Tabletter med styrkan 12,5 mg saknar brytskåra och bör inte delas då dosnoggrannheten blir osäker.

Vissa tabletter med styrkan 50 mg har brytskåra och kan delas i två lika stora delar t.ex. Losartan Actavis. Losarstad 50 mg har en krysskåra och kan delas i fyra lika stora delar.

Enteralt i sond: Tabletten kan krossas och slammas upp i 10 mL vatten.

Delmängd bör inte ges då tabletten inte löser sig helt i vätskan. Om delmängd ska ges, dela tabletten först och slamma därefter upp dosen i 10 mL vatten. OBS! Risk för osäker dosnoggrannhet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Losartan (registrerad produkt)

12,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Vissa tillverkare anger att tabletten är fukt känslig och ljuskänslig. Gäller även 50 och 100 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

Hypertoni

Barn 6 - 18 år: Startdos 0,7 mg/kg x 1 - 2, max 50 mg/DOS

Max 1,4 mg/kg/DYGN dock max 100 mg/DYGN

Exempel STARTdosering (fast dosering)

Barn 18 kg: 12,5 mg x 1 (1 tablett)

Barn 35 kg: 25 mg x 1 (2 tabletter)

Barn 71 kg: 50 mg x 1 (1 tablett)

ÖVRIG INFORMATION

Angiotensin II-hämmare, ARB* (t.ex. losartan) är kontraindicerade under graviditet och njurskadande på fostret sent i graviditeten. Det finns en ökad risk för njurskada om läkemedlet ges till prematurfödda barn.

Att fortsätta RAAS-blockad (renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad) är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

Oral lösning innehållande losartan 2,5 mg/mL har tidigare funnits tillgänglig som licensläkemedel, men slutade tillverkas av företaget MSD maj 2019.





Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827377>

PubMed PMID Lurbe et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467768>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-09-16

ePedID: 4881

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-17

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-11-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT