



Losartan oralt

(ex Cozaar) tabletter

Vid dehydrering/hypovolemi bör losartan tillfälligt sättas ut, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 12,5, 50 och 100 mg (ex Cozaar)

Tabletterna är mest lämplig för äldre barn. För yngre barn och barn med sväljsvårigheter rekommenderas losartan oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

För att underlätta nedsväljning kan tabletten krossas och slammas upp i 10 mL vatten för omedelbar administrering. Den aktiva substansen har bitter smak.

Delmängd bör inte ges då tabletten inte löser sig helt i vätskan. Om delmängd ska ges, dela tabletten först och slamma därefter upp dosen i 10 mL vatten. OBS! Risk för osäker dosnoggrannhet.

Tabletter 12,5 mg saknar brytskåra och bör inte delas då dosnoggrannheten blir osäker. Losarstad 50 mg har en krysskåra och kan delas i fyra lika stora doser. Losartan Actavis 50 mg har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.

Oralt

Enteralt: använd i första hand oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

losartan (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Vissa tillverkare anger att tabletten är fuktkänslig och ljuskänslig. Gäller samtliga styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

Hypertoni

Barn 6 - 18 år: Startdos 0,7 mg/kg x 1 - 2, max 50 mg/DOS
Max 1,4 mg/kg/DYGN dock max 100 mg/DYGN

Exempel STARTdosering (fast dosering)

Barn 18 - 34 kg: 12,5 mg x 1

Barn 35 - 49 kg: 25 mg x 1

Barn från 50 kg: 50 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Losartan tillhör gruppen renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad (RAAS blockad) och kan även benämnas som Angiotensin II-hämmare (ARB).

Att fortsätta behandlingen med losartan är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

Losartan kan orsaka hyperkalemi och vid ökad risk för dehydrering/hypovolemi ska därför detta läkemedel tillfälligt sättas ut.





Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827377>

PubMed PMID Lurbe et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467768>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4881

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-05-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT