



Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL

(Phenergan licens) liten slutvolym

Kontraindicerat till barn under 2 år.

Kontraindicerat att ge intraarteriellt eller subkutant.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning från licenspreparat Phenergan 2,5% = 25 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 1

Phenergan 25 mg/mL 0,5 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 12 mL	=	INJ-INF LÖ 1 mg/mL 12,5 mL
---------------------------------	---	--	---	---

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Phenergan 25 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 24 mL	=	INJ-INF LÖ 1 mg/mL 25 mL
-------------------------------	---	--	---	---------------------------------------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: i central infart, för att minska risken för kärlskador.

Administreras under 5 - 10 (- 15) min.

Klinisk effekt ses efter 3 - 5 min.

RIMLIG DOS för Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	-	-	0,5 mL	2,5 mL
0,25 mg/kg	-	-	2,5 mL	-
1 mg/kg	-	-	10 mL	-
Max 12,5 mg/DOS	-	-	-	12,5 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cytostatikaorsakat illamående, svårbehandlat

Barn över 2 år: Initialt 0,1 mg/kg

Vanlig dosering: 0,05 - 0,3 (- 1) mg/kg x 3 - 4 (- 6)

Max 12,5 mg/DOS

Antiemetika i samband med anestesi och operation

Barn över 2 år: 0,25 - 0,5 (- 1) mg/kg x 1 - 4 (- 6)

Max 12,5 mg/DOS

ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat till barn under 2 år pga risk för andningsdepression. Försiktighet till barn över 2 år, använd lägsta effektiva dos.

Försiktighet även för barn med hjärt- och kärlsjukdomar, dehydrering (pga ökad risk för dystoni), benmärgssuppression, mag- och tarmobstruktion, misstänkt Reye's syndrom, nedsatt leverfunktion, astma och magsår.

Kan sänka kramptröskeln.

Kan orsaka fotosensitivitet, använd därför solskydd i samband med behandling.

Potentierar effekten av opioider.

Intramuskulär administrering rekommenderas i litteraturen för att minska risken för kemisk irritation, arteriospasm och vävnadsskada. När det inte är lämpligt är intravenös injektion/infusion i central infart ett alternativ.





Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL

(Phenergan licens) liten slutvolym

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Phenergan (licensprodukt)

25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten förpackning får ej sparas pga förväxlingsrisk.

1 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

PubMed PMID Blanc VF et al. Antiemetic prophylaxis with promethazine or droperidol in paediatric outpatient strabismus surgery.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1989740>

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Phenergan 2,5%, injektionslösning

Trissel Book on Injectable Drugs

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-11-26

ePedID: 4888

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-11-26

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-11-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT