



Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL

(ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Orala droppar 7,5 mg/mL (Cilaxoral, Laxoberal)

1 droppe = 0,5 mg

10 droppar = 5 mg

Vid restsituation kan licensprodukterna Laxoberal Abführ-Tropfen eller Dulcolax Picosulfat Tropfen användas.

ADMINISTRERING

Oralt: kan blandas med liten mängd mat eller dryck

Enteralt: spädning med lika stor del vatten rekommenderas innan administrering

Tid till effekt är ca 6 - 12 timmar, därför rekommenderas intag på kvällen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumpikosulfat (registrerad produkt)

7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Öppnad förpackning hållbar 6 mån inom sjukvården, i hemmet hållbar till utgångsdatum på förpackningen (Laxoberal) eller 6 mån (Cilaxoral).

Dulcolax Picosulfat Tropfen (licensprodukt)

7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning hållbar 6 mån inom sjukvården, i hemmet hållbar till utgångsdatum på förpackningen.

Laxoberal Abführ-Tropfen (licensprodukt)

7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning hållbar 6 mån inom sjukvården, i hemmet hållbar 12 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling av barn yngre än 12 år bör sättas in av barnläkare.

Tillfällig, svår förstoppning som haft otillräcklig effekt av makrogolbehandling

Barn 6 mån - 3 år: 2,5 - 5 (-10 mg) x 1 (5 - 10 - 20 droppar)

Barn 4 - 18 år: 2,5 - 10 (- 20) mg x 1 (5 - 20 - 40 droppar)

Ges på kvällen i högst en vecka i följd, därefter eventuellt dosering varannan dag.

Vid långvarig, svår förstoppning bör lägsta effektiva dos samt kortast möjliga behandlingstid eftersträvas, se Övrig information.

ÖVRIG INFORMATION

Natriumpikosulfat utövar sin effekt på tarmneuronen. Trots lång klinisk erfarenhet saknas långtidsstudier av effekten på tarmfunktionen inom barnpopulationen.

Långtidsbehandling kan ge störningar i vätske- och elektrolytbalansen.

Natriumpikosulfat är inte förstahandspreparat vid förstoppning utan används vanligen som tillfällig tilläggsbehandling till makrogol om denna har otillräcklig behandlingseffekt. Om behandling med natriumpikosulfat behöver fortgå längre än 6 mån bör den fortsatta handläggningen ske i dialog med barn gastroenterolog.





Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL

(ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

PubMed PMID Joo et al: Alterations in colonic anatomy induced by chronic stimulant laxatives: the cathartic colon revisited. J Clin Gastroenterol. 1998

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9649012>

PubMed PMID Long term treatment with stimulant laxatives – clinical evidence for effectiveness and safety? Noergaard et al. Scandinavian Journ of Gastroenterology 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30700194>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Regionalt vårdprogram från Region Stockholm

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4892

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-02-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT