



Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL

(Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Orala droppar 7,5 mg/mL (Cilaxoral, Laxoberal)

1 droppe = 0,5 mg

10 droppar = 5 mg

ADMINISTRERING

Oralt: kan blandas med liten mängd mat eller dryck

Enteralt: spädning med lika stor del vatten rekommenderas innan administrering enteralt

Tid till effekt är ca 6 - 12 timmar, därför rekommenderas intag på kvällen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

ex Laxoberal (registrerad produkt)

7,5 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i högst 30 °C. Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling av barn yngre än 12 år bör sättas in av barnläkare

Tillfällig, svår förstoppning som haft otillräcklig effekt av makrogolbehandling

Barn 6 mån - 3 år: 2,5 - 5 (-10 mg) x 1 (5 - 10 - 20 droppar)

Barn 4 - 18 år: 2,5 - 10 (-20) mg x 1 (5 - 20 - 40 droppar)

Ges på kvällen i högst en vecka i följd, därefter eventuellt dosering varannan dag.

Vid långvarig, svår förstoppning bör byte till preparat med annan farmakologisk verkningsmekanism övervägas efter 1 månads behandling eftersom det finns risk för irreversibel påverkan på tarmmotoriken vid långvarigt bruk.

ÖVRIG INFORMATION

Natriumpikosulfat utövar sin effekt på tarmneuronen. Långvarigt bruk kan leda till störningar i tarmmotoriken. Dessutom kan störningar i vätske- och elektrolytbalansen uppkomma.

Trots lång klinisk erfarenhet för detta preparat saknas tarmmorfologiska uppföljningsstudier inom barnpopulationen.

Detta preparat är inte förstahandspreparat vid förstoppning utan används vanligen som tillfällig tilläggsbehandling till makrogol om denna har otillräcklig behandlingseffekt.





Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

PubMed PMID Joo et al: Alterations in colonic anatomy induced by chronic stimulant laxatives: the cathartic colon revisited. J Clin Gastroenterol. 1998

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9649012>

PubMed PMID Long term treatment with stimulant laxatives – clinical evidence for effectiveness and safety? Noergaard et al. Scandinavian Journ of Gastroenterology 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30700194>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Regionalt vårdprogram från Region Stockholm

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-09-22

ePedID: 4892

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-09-22

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-09-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT