



Klobetasolpropionat utvärtes

(ex Dermovat)

Kontraindicerat för barn under 1 år.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 0,05 % (ex Clobetasol Teva)
Salva 0,05 % (Dermovat)
Kutan lösning 0,5 mg/mL (Dermovat)

ADMINISTRERING

Utvärtes:
Dermatoser: Applicera ett tunt lager 1 - 2 gånger dagligen på den affekterade huden.

Kutan lösning lämplig för hårbotten.

Fimosis: Applicera varje kväll genom att dra tillbaka förhuden, utan att det gör ont, och smörj in preputiet i höjd med förträngningen, dvs längst ut. Smörj inte på ollonet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klobetasolpropionat (registrerad produkt)

Salva

Förvaras vid högst 30 °C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

Kräm

Förvaras vid högst 30 °C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

Kutan lösning

Förvaras vid högst 25 °C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Dermatoser

Korttidsbehandling för resistent dermatoser där tidigare behandling med mindre potenta topikala kortikosteroider inte gett önskad effekt.

Barn 1 - 18 år: Applicera ett tunt lager 1 - 2 gånger dagligen på den affekterade huden tills förbättring uppnås, dock under högst 4 veckor.

Applikationsfrekvensen ska trappas ned successivt.

Fimosis

Behandling av fimosis som inte släpper spontant vid pubertet. För pojkar före pubertet är behandling endast motiverad vid miktionssvårigheter eller upprepade balaniter.

Barn från 5 år: Applicera 1 x 1 till kvällen i (1 -) 4 - 6 veckor. Max behandlingstid är 8 veckor. Se även under Övrig information.

Behandlingen utvärderas efter ca 8 veckor och kan vid behov upprepas ytterligare en gång.





Klobetasolpropionat utvärtes

(ex Dermovat)

ÖVRIG INFORMATION

Klobetasolpropionat tillhör den mest potenta klassen av topikala kortikosteroider (grupp IV) och långvarig användning kan leda till allvarliga biverkningar som t.ex. binjuresuppression. Långtidsbehandling hos barn under 12 år ska därför undvikas, behandlingen bör om möjligt begränsas till fem dagar. Obs! Denna begränsning gäller inte vid indikation fimosis.

Kontraindicerat för barn under 1 år. Barn och spädbarn kan vara mer känsliga för systemiska biverkningar då de kan absorbera en proportionellt större mängd av topikala kortikosteroider, jämfört med vuxna.

Ocklusiva förband ska undvikas, då de kan öka absorptionen och därmed risken för systemiska och lokala biverkningar. Observera att blöja kan fungera som ett ocklusivt förband.

Minsta möjliga effektiva mängd bör appliceras vid behandling med klobetasonpropionat.

Behandling av fimosis: Avbryt kortisonbehandlingen genast när förhuden går att dra tillbaka, fortsätt sedan att tänja förhuden dagligen för att undvika att huden stramas till igen. För en del pojkar räcker det att behandla med kortison i en vecka medan andra kan behöva behandlas upp till 8 veckor.



Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat)



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial.
Läkemedelskommittéerna i Uppsala - Örebroregionen (7 landsting)

https://region uppsala.se/globalassets/samverkanswebben/for-varldgivarer/lakemedel/dokument-till-reklistor/barnreklistan/rekommenderade_lakemedel_for_barn_2021_2022.pdf

Internetadress VGR, Alfresco - Förhudsförträngning (fimos) hos pojkar under 18 år -
behandling med kortisonsalva

[https://mellanarkiv-](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9642-738863596-419/surrogate/F%3b6rhudsfc3b6rtr%3a4ngning%20(fimos)%20hos%20pojkar%20under%2018%20%3a5r%20-%20behandling%20med%20kortisonsalv)

[offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9642-738863596-419/surrogate/F%3b6rhudsfc3b6rtr%3a4ngning%20\(fimos\)%20hos%20pojkar%20under%2018%20%3a5r%20-%20behandling%20med%20kortisonsalv](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9642-738863596-419/surrogate/F%3b6rhudsfc3b6rtr%3a4ngning%20(fimos)%20hos%20pojkar%20under%2018%20%3a5r%20-%20behandling%20med%20kortisonsalv)

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4893

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-01-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT