



# Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g

(Locobase LPL) kräm

## ADMINISTRERING

Utvärtes: Påstrykes dagligen, gärna direkt efter kontakt med vatten.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Locobase (registrerad produkt)

Kräm

Förvaras vid högst 25 °C, i skydd mot kyla. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Hyperkeratotisk hud och iktyos

Påstrykes på den förtjockade huden 1 - 2 gånger dagligen.

## ÖVRIG INFORMATION

Använd ej på brännskadad hud, i öppna sår eller hud som är barriärskadad.

Barn är mer känsliga än vuxna för absorption av propylenglykol via huden. Toxiska reaktioner finns rapporterat vid administrering av stora mängder propylenglykol. Propylenglykol kan vara ototoxiskt, applicera därför ej i hörselgångarna.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4904

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-08-16

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**