



Loperamid oralt 2 mg

(ex Dimor) kapsel/tablett

Risk för tillvänjning vid långvarig behandling.

Risk för CNS-depression, andningsdepression och hjärtrytmrubbningar vid överdosering.

Kontraindicerat till barn under 2 år.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel hård (ex Loperamid Mylan)
Tablett (ex Dimor)
Munsönderfallande tablett (Imodium)

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt: Kapslarna kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten direkt före administrering.

Tabletten kan lösas upp och ges i sond.

Dimor saknar skåra, men kan delas. De flesta andra loperamidtabletter kan ej delas eller saknar information om delbarhet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Loperamid (registrerad produkt)

2 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även kapslarna.

2 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kontraindicerat till barn under 2 år. Endast undantagsvis för barn under 12 år, se Övrig information. Behandlingsindikation hos barn under 12 år bör diskuteras med en barnläkare med gastroenterologisk kompetens. Behandling så kort tid som möjligt. Om ingen klinisk effekt har noterats inom 2 dygn ska behandlingen avslutas och läkare kontaktas.

Symtomatisk behandling av akuta specifika diarréer

Dosera efter vikt om barnet väger MINDRE än angivet intervall för barnets ålder. Minst 2 - 3 tim mellan doserna.

Barn 2 - 5 år (13 - 20 kg): Inledningsvis 1 mg, därefter 1 mg efter varje diarré. Max 3 mg/DYGN, i max 3 dygn.

Barn 6 - 8 år (21 - 26 kg): Inledningsvis 2 mg, därefter 1 mg efter varje diarré. Max 4 mg/DYGN, i max 3 dygn.

Barn 9 - 11 år (27 - 43 kg): Inledningsvis 2 mg, därefter 1 mg efter varje diarré. Max 6 mg/DYGN, i max 5 dygn.

Barn 12 - 18 år (från 44 kg): Inledningsvis 4 mg, därefter 2 mg efter varje diarré. Max 16 mg/DYGN, i max 5 dygn.

ÖVRIG INFORMATION

Bör användas i lägsta möjliga dos och behandlingstid för att minimera risken för biverkningar. Bör ej kombineras med andra läkemedel som kan ge förlängd QT-tid. Barn har en högre känslighet än vuxna för loperamids CNS-deprimerande effekt, dess kardiella toxicitet samt ökad risk för andningsdepression. Bör användas med stor försiktighet till barn med nedsatt leverfunktion.





Loperamid oralt 2 mg

(ex Dimor) kapsel/tablett

REFERENS/LÄNK

Artikel Läkartidningen: Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid. Myllymäki et al 2020

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/fallbeskrivning/2020/01/livsfarligt-missbruk-av-receptfria-diarrelakemedlet-loperamid/>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress UpToDate

<http://www.uptodate.com/>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-07-08

ePedID: 4905

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-07-08

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-07-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT