



## Loperamid oralt 2 mg

(ex Dimor) kapsel/tablett

**Risk för tillvänjning vid långvarig behandling.**

**Risk för CNS-effekter och hjärtbiverkningar vid överdosering.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel hård (ex Loperamid Mylan)  
Tablett (ex Dimor)  
Munsönderfallande tablett (Imodium)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt  
Enteralt i sond:  
Kapslarna kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten direkt före administrering.

Tabletten kan lösas upp och ges i sond.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Loperamid (registrerad produkt)

2 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även kapslarna.

2 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Symtomatisk behandling av akuta ospecifika diarréer

Barn 12 - 18 år: Inledningsvis 4 mg, därefter 2 mg efter varje diarré.  
Mellan första och andra dosen ska det gå 2 - 3 timmar.

Max 16 mg/DYGN och behandling så kort tid som möjligt, max 5 dygn.

Om klinisk effekt inte har noterats inom två dygn ska preparatet sättas ut och läkare kontaktas.

### REFERENS/LÄNK

Artikel Läkartidningen: Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid.  
Myllymäki et al 2020

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/fallbeskrivning/2020/01/livsfarligt-missbruk-av-receptfria-diarrerlakemedlet-loperamid/>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-03-16

ePedID: 4905

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-16

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-03-16

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**