



Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm

ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes:

Undvik kontakt med ögonen. Efter appliceringen bildas en torr film på huden. Den kan tvättas bort med vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Väteperoxid (registrerad produkt)

1 %, Kräm

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till flera patienter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Impetigo

Barn 1 mån - 18 år:

Appliceras 2 - 3 gånger dagligen på det infekterade området.

Behandlingstid: bör inte överstiga 3 - 4 veckor

ÖVRIG INFORMATION

Väteperoxid har bactericid effekt på *Stafylococcus aureus* och beta-hemolytiska streptokocker.

Väteperoxid har dock tveksam effekt vid impetigo och i första hand rekommenderas tvål, vatten och eventuellt klorhexidinlösning, därefter fusidinsyra.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Internetmedicin, Impetigo (svinkoppor)

<https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1057>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-04-03

ePedID: 4906

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-04-06

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT