



Propylenglykol utvärtes

(ex Propyderm)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 200 mg/mL (ex Propyderm)
Kutan emulsion 200 mg/mL (ex Propyless)

ADMINISTRERING

Utvärtes: Smörjes vid behov. Applicera alltid efter kontakt med vatten.
Använd så mycket kräm vid applicering som huden kan ta upp.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Propylenglykol (registrerad produkt)

Kräm

Förvaras i rumstemperatur. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

Kutan emulsion

Burk förvaras vid högst 30 °C, tub förvaras vid högst 25 °C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Torr hud

Smörjes vid behov.

ÖVRIG INFORMATION

Applicera inte propylenglykol på brännskadad hud.

Barn är mer känsliga än vuxna för absorption av propylenglykol via huden. Toxiska reaktioner finns rapporterat vid administrering av stora mängder propylenglykol.

Propylenglykol kan vara ototoxiskt, applicera därför ej i hörselgångarna.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4908

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-08-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT