



## Ibuprofen intravenös inf 600 mg/100 mL = 6 mg/mL

**Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Ibuprofen B.Braun 600 mg/100 mL = 6 mg/mL, behöver ej spädas.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: 10 - 30 min

### RIMLIG DOS för Ibuprofen intravenös inf 600 mg/100 mL = 6 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7 mg/kg	-	-	11,67 mL	58,33 mL
10 mg/kg	-	-	16,67 mL	83,33 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Ibuprofen (ex Ipren) (registrerad produkt)

6 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Bruten förpackning: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Smärta, korttidsbehandling

Barn 6 mån - 18 år: 7 (- 10) mg/kg x 4 (- 6)

Maxdos

Barn från 6 mån och under 60 kg: 40 mg/kg/DYGN och 400 mg/DOS

Barn över 60 kg: 2,4 g/DYGN

### ÖVRIG INFORMATION

Ibuprofen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion. Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Ibuprofen är det NSAID-preparat med minst biverkningar och mest evidens för säker användning till barn.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

<https://lv.se/procedursmarta-barn>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-07-05

ePedID: 4910

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-07-05

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-07-05

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**