



Parecoxib intravenös inj 4 mg/mL

(Dynastat)

Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.

EN-STEGSSPÄDNING

Dynastat		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INJ-INF LÖ
40 mg		eller 100 mg/mL	=	4 mg/mL
1 st	+	10 mL		10 mL

Beredningsinstruktion:

Observera att 10 mL spädningsvätska inte får plats i injektionsflaskan med pulver. Lösningen iordningställs i dessa fall genom att ungefär hälften av spädningsvätskan först tillsätts till flaskan med pulver, som skakas kraftigt. När pulvret är upplöst dras lösningen tillbaka till resten av spädningsvätskan i sprutan och blandas där till en homogen lösning.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion

RIMLIG DOS för Parecoxib intravenös inj 4 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,4 mg/kg	-	-	1 mL	5 mL
0,5 mg/kg	-	-	1,25 mL	6,25 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dynastat (registrerad produkt)

40 mg, Pulver till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

4 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Färdigberedd lösning får förvaras högst 12 timmar vid 25 °C, men får inte kylas eller frysas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta, korttidsbehandling (inkl postoperativ smärta)

Barn 3 mån - 18 år: (0,4 -) 0,5 mg/kg x 1 (- 2)

ÖVRIG INFORMATION

Parecoxib är en selektiv COX-2 hämmare.

Försiktighet vid nedsatt njur- och leverfunktion, gastroenterit, långvarig feber, vid varicella zosterinfektion, hjärtsvikt, antikoagulationsbehandling. Bör inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Selektiva COX-2 hämmare orsakar mindre GI-blödningar än andra NSAID-läkemedel.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress VGR, Alfresco - Tonsillotomi-tonsillektomi barn anestesirutin

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/21036/Tonsillotomi-tonsillectomi%20barn%20anestesirutin.pdf?a=false&guest=true>

Micromedex

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4920

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-06-20

ePedID: 4920

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-06-28

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-06-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT