



Meropenem intravenös inf 20 mg/mL

(ex Meronem)

EN-STEGSSPÄDNING

Meropenem		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50	INF
500 mg	+	mg/mL	= 20 mg/mL
1 st		25 mL	25 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Meropenem		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50	INF
1 g	+	mg/mL	= 20 mg/mL
1 st		50 mL	50 mL

Beredningsinstruktion:

Meropenem kan vara svårlosligt och då ska flaskan skakas i ca 1 min efter att spädningsvätskan har tillsatts. Låt flaskan stå en stund och skaka sedan igen i 1 min. Kontrollera att lösningen är klar. Vid behov bör skakning upprepas och flaskan stå en stund igen; det kan ta 10 - 15 minuter att lösa upp allt pulver. Bruksfärdiga lösningar är färglösa eller svagt gula.

Hållbarheten påverkas av valet av spädningsvätska, se Hållbarhet och förvaring.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, Kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Kontinuerlig infusion

Intravenös infusion:

Barn under 3 mån: ges under 30 min

Barn över 3 mån: ges under 15 - 30 min

RIMLIG DOS för Meropenem intravenös inf 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL
40 mg/kg	2 mL	10 mL	20 mL	100 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för meropenem

Vid allvarlig infektion så som meningit, septisk påverkan eller shuntinfektion används den högre dosen i intervallen.

Nyfödda:

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 20 - 40 mg/kg x 2

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 20 - 40 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Oberoende av gestationsålder vid födsel: 20 - 40 mg/kg x 3

Barn 1 mån - 18 år:

20 - 40 mg/kg x 3 alternativt 20 mg/kg x 4, max 6 g/dygn

Alternativ fast dosering för barn över 50 kg: 500 mg - 2 g x 3

Behandlingstid: 7 - 21 dagar

ECMO

Laddningsdos: 20 mg/kg, max 2 g

Därefter kontinuerlig infusion:

Barn 1 - 3 mån: 30 - 80 mg/kg/dygn

Barn 3 mån - 12 år: 60 - 120 mg/kg/dygn

Barn över 12 år: 1,5 - 6 g/dygn

Doseringen styrs utifrån s-koncentrationen av meropenem. Målvärde 20 - 40 mikrog/mL.

Immunosupprimerade barn med feber

Barn 1 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3 - 4, max 6 g/dygn





Meropenem intravenös inf 20 mg/mL

(ex Meronem)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Meropenem (registrerad produkt)

20 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Spädning med NaCl: 6 tim i rumstemp eller 24 tim i kylskåp. Spädning med glukos: lösningen ska användas direkt (maxtid mellan iordningställande och avslut av infusion 1 timme).

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 20 - 40 mg/kg x 3, max 6 g/dygn

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Meropenem är mer stabil vid lägre koncentration i lösningen. Därav kan svagare lösning sparas längre tid.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompedium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompedium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

NeoFax

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Arbetsgruppen för CF - Akut PM

<http://www3.svls.se/sektioner/cf/index.php/medicinska-pm>

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrik hematologi och onkologi - Febril neutropeni

<http://www.blf.net/onko/page16/page16.html>

Trissel Book on Injectable Drugs

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4921



Meropenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Meronem)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-02-03

ePedID: 4921

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-05

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-02-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT