



Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL

(ex Xylocain utan konserveringsmedel)

EKG-övervakning krävs. Risk för arytm och/eller hypotension.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektion/infusionslösningar med lidokain UTAN konserveringsmedel:

Alt. 1: Xylocain utan konserv.medel eller Lidocaine Accord 10 mg/mL, behöver ej spädas

Alt. 2: Spädning av Lidocaine Accord, Lidokain Ebb eller Xylocard 20 mg/mL, se nedan

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Lidokain utan kons. 20 mg/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 5 mL	=	INJ-INF LÖ 10 mg/mL 10 mL
---	---	---	---	--

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion:

Laddningsdos vid kramper ges under 10 min.

Laddningsdos vid arytm ges under 3 - 5 min.

Intravenös infusion (kontinuerlig):

.....

Lidokain kan även ges intraosseöst.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obs! Indikationerna nedan har OLIKA DOSERINGSENHETER.

Obs! Indikation SMÄRTA har betydligt LÄGRE DOS än övriga indikationer.

Kramper hos nyfödda

Laddningsdos: 2 mg/kg

Underhållsdos: (2 -) 4 - 6 mg/kg/TIM

Behandlingen bör avslutas inom 48 timmar genom stegvis nedtrappning. Längre behandlingstid medför risk för ackumulering av prokonvulsiva metaboliter som vid utsättning kan ge upphov till nya anfall.

Ventrikulär arytm

Nyfödda:

Laddningsdos: 0,5 - 1 mg/kg

Därefter kontinuerlig infusion 20 - 70 MIKROG/kg/MIN

Barn 1 mån - 18 år:

Laddningsdos: 0,5 - 1 mg/kg, max 100 mg/DOS

Därefter kontinuerlig infusion 20 - 70 MIKROG/kg/MIN

Om infusionen inte kan startas inom 15 min efter laddningsdosen kan upprepade laddningsdoser ges med minst 5 minuters intervall tills infusionen startas.

Max kumulativ laddningsdos/tim: 3 mg/kg eller 300 mg

Neuropatisk smärta

Nyfödda (fullgångna): Initialt 0,3 - 0,5 mg/kg/TIM, kan trappas upp till 1 mg/kg/TIM

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,3 - 0,5 mg/kg/TIM, kan trappas upp till 1 mg/kg/TIM

Behandlingstid: upp till 5 dygn





Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL

(ex Xylocain utan konserveringsmedel)

RIMLIG DOS för Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
2 mg/kg	0,2 mL	1 mL	-	-
2 mg/kg/TIM	0,2 mL/tim	1 mL/tim	-	-
6 mg/kg/TIM	0,6 mL/tim	3 mL/tim	-	-
20 MIKROG/kg/MIN	0,12 mL/tim	0,6 mL/tim	1,2 mL/tim	6 mL/tim
70 MIKROG/kg/MIN	0,42 mL/tim	2,1 mL/tim	4,2 mL/tim	21 mL/tim
SMÄRTA 0,3 mg/kg/TIM	-	0,15 mL/tim	0,3 mL/tim	1,5 mL/tim
SMÄRTA 0,5 mg/kg/TIM	-	0,25 mL/tim	0,5 mL/tim	2,5 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Lidokain utan kons. (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Efter iordningställande: 12 tim i rumstemp. Alt. kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning el utvärdering utförts enl Sv läkemedelsstandard, se ref Hållbarhetsinfo.

20 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Sparas ej efter första uttag.

ÖVRIG INFORMATION

Lidokain bör inte kombineras med fosfentyoin/fentyoin pga ökad risk för arytmier och hypotension.

Försiktighet vid nedsatt lever- eller njurfunktion då det finns risk för ackumulering och toxiska effekter vid upprepade behandling. Lidokain metaboliseras i levern och de aktiva metaboliterna utsöndras via njurarna. Metaboliterna har mindre uttalad antiarytmisk effekt än lidokain.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Micromedex

NeoFax

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Kramper

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-12-04

ePedID: 4929

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-11

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT