



Spironolakton oralt 5 mg/mL

(Extempore) oral vätska

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spironolakton oral vätska och suspension 5 mg/mL (extempore), olika formuleringar se Övrig information.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: Går att ge i sond, men mycket trögflytande. För att underlätta administrering via sond kan läkemedlet spädas med lite vatten och skakas om precis innan administrering.

Spironolakton bör ges i samband med måltid.

RIMLIG DOS för Spironolakton oralt 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
3 mg/kg	0,6 mL	3 mL	6 mL	30 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Spironolakton i sockersirap (extempore - ej lagervara)

5 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Hållbar 60 dagar från tillverkningsdatum (oberoende av om förpackningen är öppnad eller inte).

Spironolakton i svartvinbärssirap (extempore - ej lagervara)

5 mg/mL, Oral vätska

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Hållbar 28 dagar från tillverkningsdatum (oberoende av om förpackningen är öppnad eller inte).

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behov av kaliumsparande diuretika

Nyfödda: 0,5 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 3 mg/kg/dygn.

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 3,3 mg/kg/dygn, 100 mg/dygn.

Nefrotiskt syndrom (om besvärande ödem utan samtidig hypovolemi)

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 3 mg/kg x 1

Ödem vid hjärtsvikt och ascites

Nyfödda: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg x 1 - 2. Max 7 mg/kg/dygn.

Barn 1 - 12 år: 0,5 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 9 mg/kg/dygn.

Barn 12 - 18 år: 25 - 50 (- 100) mg x 1 - 2. Max 400 mg/dygn.

Maxdoserna ovan gäller vid ascites eller misstanke om hyperaldosteronism.

ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion.

APL tillverkar både Spironolakton oral vätska i svartvinbärssirap (innehåller konserveringsmedlet natriumbensoat) och oral suspension i sockersirap (innehåller konserveringsmedlet metylparahydroxibensoat E218 och liten mängd natriumbensoat). Hållbarheten och förvaringsanvisningarna skiljer sig för dessa produkter, se Hållbarhet.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Nefrotiskt syndrom

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



Spironolakton oralt 5 mg/mL

(Extempore) oral vätska



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-08-21

ePedID: 4932

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-08-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-08-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT