



Spironolakton oralt 5 mg/mL

(Extempore) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral suspension 5 mg/mL (extempore), olika smaker med olika konserveringsmedel, se Övrig information.

INGEN SPÄDNING

ORAL SUSP
5 mg/mL
flera volymer finns

ARBETSMILJÖ

Använd handskar vid hantering. Om tablett/kapsel delas/öppnas ska handskar samt skyddskläder användas. Använd munskydd om tillgång till dragskåp saknas. Se Övrig information.

ADMINISTRERING

Oralt: Spironolakton bör ges i samband med måltid för att minska risken för magbiverkningar. När läkemedlet tas med mat, bör detta göras vid varje dos för att undvika fluktuerande absorption, då matintag ökar upptaget.

Enteralt: Går att ge enteralt, men suspensionen är mycket trögflytande. För att underlätta enteral administrering kan läkemedlet spädas med lite vatten och skakas om precis innan administrering.

RIMLIG DOS för Spironolakton oralt 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,25 mg/kg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
1 mg/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL
3 mg/kg	0,6 mL	3 mL	6 mL	-
100 mg	-	-	-	20 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behov av kaliumsparande diuretika

Nyfödda: 0,25 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 3 mg/kg/DYGN.
Barn 1 mån - 18 år: 0,25 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 3,3 mg/kg/DYGN, men max 100 mg/DYGN.

Nefrotiskt syndrom (om besvärande ödem utan samtidig hypovolemi) (ej förstahandsval)

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 3 mg/kg x 1

Ödem vid hjärtsvikt och ascites

Nyfödda: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg x 1 - 2. Max 7 mg/kg/DYGN.
Barn 1 mån - 11 år: 0,5 - 1 (- 3) mg/kg x 1 - 2. Max 9 mg/kg/DYGN.
Barn 12 - 18 år (fast dos): 25 - 50 (- 100) mg x 1 - 2. Max 400 mg/DYGN.

Maxdoserna ovan gäller vid ascites eller misstanke om hyperaldosteronism.

ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion, pga risk för hyperkalemi.

Dosen för spironolakton oral suspension är inte terapeutiskt ekvivalent med samma dos av spironolakton i tablettform. Suspension resulterar i 15 % - 37 % högre serumkoncentration jämfört med tabletter.

Vid manipulering av tablett/kapsel kan spironolakton absorberas via huden. Vid hudkontakt samt inandning kan fertiliteten samt ett foster under graviditeten påverkas. På vårdavdelning ska nitrilhandskar samt munskydd (inte andningsskydd) användas. Vid hantering av stora mängder spironolaktonpulver, ex. tillverkning, rekommenderas andningsskydd samt dubbla cyto-handskar, detta är inte nödvändigt på vårdavdelning.

APL tillverkar både Spironolakton oral suspension i svartvinbärssirap (innehåller konserveringsmedlet natriumbensoat E211) och Spironolakton oral suspension i sockersirap (innehåller konserveringsmedlet metylparahydroxisbensoat E218). Hållbarheten skiljer sig för dessa produkter, se Hållbarhet och Förvaring.



Spironolakton oralt 5 mg/mL

(Extempore) oral suspension

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Spironolakton i sockersirap (extempore)

5 mg/mL, Oral suspension

Förvaras vid högst 25 °C. Hållbar 60 dagar från tillverkningsdatum (oberoende av om förpackningen är öppnad eller inte).

Spironolakton i svartvinbärssirap (extempore)

5 mg/mL, Oral suspension

Förvaras vid högst 25 °C. Hållbar 28 dagar från tillverkningsdatum (oberoende av om förpackningen är öppnad eller inte).

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Drugbank

<http://www.drugbank.ca>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Internetadress NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings, 2016.

<https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Nefrotiskt syndrom

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 4932

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT