



Adalimumab subkutan inj

(ex Amgevita, Humira)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Referensläkemedel:

Humira 20 mg/0,2 mL, 40 mg/0,4 mL och 80 mg/0,8 mL

Biosimilärer:

Amgevita 20 mg/0,4 mL och 40 mg/0,8 mL

Hukyndra 40 mg/0,4 mL

Hulio, Hyrimoz, Idacio och Imraldi 40 mg/0,8 mL

Citratfria produkter: Amgevita, Hulio och Humira, se Övrig information.

ADMINISTRERING

Subkutan injektion: tillgängliga som förfylld penna och förfylld spruta.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adalimumab (registrerad produkt)

Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Pennan kan förvaras i rumstemperatur, hållbarhetstiden varierar beroende på vald produkt, läs bipacksedeln för korrekt förvaringsinstruktion. Skyddas från ljus.

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Sprutan kan förvaras i rumstemperatur, hållbarhetstiden varierar beroende på vald produkt, läs bipacksedeln för korrekt förvaringsinstruktion. Skyddas från ljus.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen initieras av eller i samråd med en specialist.

Behandling med TNF antagonister bör inte påbörjas under pågående infektion. Pågående behandling bör avbrytas om en ny allvarlig infektion eller sepsis utvecklas under behandlingen.

Crohns sjukdom

Barn 6 - 18 år

Barn under 40 kg:

Induktionsbehandling

Dag 1: 40 mg

Dag 15: 20 mg

Alternativt när snabbare behandlingssvar önskas (risk för ökade biverkningar):

Dag 1: 80 mg

Dag 15: 40 mg

Underhållsbehandling, med start dag 29

20 mg VARANNAN vecka, alternativt vid otillräckligt terapissvar 20 mg varje vecka

Barn från 40 kg:

Induktionsbehandling

Dag 1: 80 mg

Dag 15 : 40 mg

Alternativt när snabbare behandlingssvar önskas (risk för ökade biverkningar):

Dag 1: 160 mg

Dag 15: 80 mg

Underhållsbehandling, med start dag 29

40 mg VARANNAN vecka, alternativt vid otillräckligt terapissvar 40 mg varje vecka eller 80 mg VARANNAN vecka





Adalimumab subkutan inj

(ex Amgevita, Humira)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ulcerös kolit

Barn 5 - 18 år

Barn 20 - 39 kg:

Induktionsbehandling

Dag 1: 80 mg

Dag 8: 40 mg

Dag 15: 40 mg

Underhållsbehandling med start dag 29

40 mg VARANNAN vecka alternativt 20 mg varje vecka

Barn från 40 kg:

Induktionsbehandling

Dag 1: 160 mg (kan delas på två dagar)

Dag 8: 80 mg

Dag 15: 80 mg

Underhållsbehandling med start dag 29

80 mg VARANNAN vecka alternativt 40 mg varje vecka

Juvenil idiopatisk artrit

Barn 2 - 18 år:

Behandlingen doseras VARANNAN vecka

Barn 10 - 14 kg: 10 mg

Barn 15 - 29 kg: 20 mg

Barn från 30 kg: 40 mg

Kliniskt svar erhålls vanligen inom 12 veckors behandling. Överväg utsättning om kliniskt svar saknas inom detta tidsintervall.





Adalimumab subkutan inj

(ex Amgevita, Humira)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Placksoriasis

Barn 4 - 18 år

Barn 15 - 29 kg:

Dag 1: 20 mg

Dag 8: 20 mg

Därefter 20 mg VARANNAN vecka

Barn från 30 kg:

Dag 1: 40 mg

Dag 8: 40 mg

Därefter 40 mg VARANNAN vecka

Kliniskt svar erhålls vanligen inom 16 veckors behandling. Överväg utsättning om kliniskt svar saknas inom detta tidsintervall.

ÖVRIG INFORMATION

Amgevitas penna har en annan konstruktion än Humira, instruktionsfilm finns, se referens.

Citratfria produkter tenderar att ha mindre biverkningar i form av instickssmärta.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



Adalimumab subkutan inj (ex Amgevita, Humira)



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4934

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4934

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-08-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT