



Naproxen oralt

(ex Pronaxen)

Försiktighet vid gastroenterit, långvarig feber och nedsatt njur- och leverfunktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 250 mg och 500 mg
Enterotablett 250 mg och 500 mg

ADMINISTRERING

Oralt:

Naproxen Bluefish 250 mg samt Pronaxen 250 mg kan delas i två lika stora doser. Brytskåra på övriga preparat behöver inte betyda att tablett kan delas i två jämna doser, se produktresumé. Enterotabletter sväljes hela, de är överdragna med ett magsaftresistent skikt för att skydda magslemhinnan.

Enteralt:

Snabbfrisättande tabletter kan krossas, lösas upp i vatten och administreras enteralt. Går även att administrera i jejunum.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Naproxen (registrerad produkt)

250 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Pronaxen och Naproxen Orifarm är ljuskänsliga, förvaras i originalförpackningen. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Om halv tablett förskrivs, kontrollera att tablett är delbar i två lika stora doser. Naproxen Bluefish 250 mg samt Pronaxen 250 mg kan delas i två jämna doser.

Smärta, lätt - måttlig intensitet

Barn 5 - 18 år: 5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn från 5 år - 49 kg: 125 mg x 2

Barn 50 kg - 59 kg: 250 mg x 2

Barn från 60 kg: 500 mg x 2

Migrän

Behandling påbörjas vid första tecken på migrän.

Barn 5 år upp till 49 kg: 5 - 7,5 mg/kg x 1 - 2

Alternativt (fast dosering):

Barn 5 år upp till 34 kg: 125 mg x 1 - 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 1 - 2

Barn från 50 kg:

Dygn 1: 750 mg initialt, därefter 250 mg vid behov. Max 1250 mg/DYGN

Från dygn 2: 250 mg vid behov, max 1000 mg/DYGN

Juvenil idiopatisk artit

Barn 5 - 18 år: 5 - 7,5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn 5 år upp till 34 kg: 125 mg x 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 375 mg x 2

Barn från 60 kg: 500 mg x 2





Naproxen oralt

(ex Pronaxen)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Dysmenorré

Behandling påbörjas vid första tecken på menstruation.

Barn 10 - 18 år: 5 - 7,5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn upp till 34 kg: 125 mg x 2

Barn: 35- 49 kg: 250 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 375 mg x 2

Barn från 60 kg: 250 - 500 mg. Första dygnet max 1250 mg totalt, därefter max 1000 mg/DYGN.

ÖVRIG INFORMATION

Naproxen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion.

Allvarliga akuta astmaanfall kan förvärras av naproxen. Astmadiagnos i sig är dock inget hinder för att ordinera naproxen.





Naproxen oralt

(ex Pronaxen)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress SFBABI - Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/delforeningar/sfbabi/riktlinjer/>

Internetadress UpToDate

<http://www.uptodate.com/>

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Farm-beh-2020-06-09.pdf>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-10-21

ePedID: 4939

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-11-17

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-11-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT