



# Naproxen oralt

(ex Pronaxen) tabletter

**Försiktighet vid gastroenterit, långvarig feber och nedsatt njur- och leverfunktion.**

**Ökad blödningsbenägenhet, se Övrig information.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 250 mg och 500 mg (ex Pronaxen)  
Enterotablett 250 mg och 500 mg (ex Naprosyn)

## ADMINISTRERING

Oralt:  
Naproxen Bluefish 250 mg samt Pronaxen 250 mg kan delas i två lika stora doser. Brytskåra på övriga preparat behöver inte betyda att tablettens kan delas i två jämna doser, se produktresumé. Enterotabletter sväljes hela, de är överdragna med ett magsaftresistent skikt för att skydda magslemhinnan.

Enteralt:  
Snabbfrisättande tabletter kan krossas, lösas upp i vatten och administreras enteralt. Går även att administrera i jejunum.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Naproxen (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Pronaxen och Naproxen Orifarm är ljuskänsliga, förvaras i originalförpackningen. Gäller båda styrkorna.

Enterotablett

Förvaras i rumstemperatur. Ljuskänsligt, förvaras i originalförpackningen. Gäller båda styrkorna.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Om halv tablett förskrivs, kontrollera att tablettens är delbar i två lika stora doser. Naproxen Bluefish 250 mg samt Pronaxen 250 mg kan delas i två jämna doser.

### Smärta, lätt - måttlig intensitet

Barn 5 - 18 år: 5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn från 5 år upp till 49 kg: 125 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 250 mg x 2

Barn från 60 kg: 500 mg x 2

### Migrän

Behandling påbörjas vid första tecken på migrän.

Barn från 5 år upp till 49 kg: 5 - 7,5 mg/kg x 1 - 2

Alternativt (fast dosering):

Barn från 5 år upp till 34 kg: 125 mg x 1 - 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 1 - 2

Barn från 50 kg:

Dygn 1: 750 mg initialt, därefter 250 mg vid behov. Max 1250 mg/DYGN

Från dygn 2: 250 mg vid behov, max 1000 mg/DYGN

### Juvenil idiopatisk artit

Barn 5 - 18 år: 5 - 7,5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn från 5 år upp till 34 kg: 125 mg x 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 375 mg x 2

Barn från 60 kg: 500 mg x 2



## Naproxen oralt

(ex Pronaxen) tabletter

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Dysmenorré

Behandling påbörjas vid första tecken på menstruation.

Barn 10 - 18 år: 5 - 7,5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn upp till 34 kg: 125 mg x 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 375 mg x 2

Barn från 60 kg: 250 - 500 mg. Första dygnet max 1250 mg totalt, därefter max 1000 mg/DYGN.

### ÖVRIG INFORMATION

Naproxen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Naproxen kan ge en ökad blödningsbenägenhet, efter intag av naproxen bör det därför gå minst 48 timmar innan procedur (som t.ex. LP) utförs.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion.

Allvarliga akuta astmaanfall kan förvärras av naproxen. Läkemedlet kan dock ges till en majoritet av barn med astmadiagnos efter utvärdering av första dos på sjukhuset.





## Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Internetmedicin - Smärta, akut och procedurrelaterad – barn och ungdomar

<https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/smarta/smarta-akut-och-procedurrelaterad-barn-och-ungdomar/>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress SFBABI - Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/delforeningar/sfbabi/riktlinjer/>

Internetadress UpToDate

<http://www.uptodate.com/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Breivik H et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2010 Jan;54(1)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19839941>

PubMed PMID Richer L et al. Drugs for the acute treatment of migraine in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Apr 19;4(4)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27091010>

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Farm-beh-2020-06-09.pdf>



## Naproxen oralt

(ex Pronaxen) tabletter



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm  
Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 4939  
Versionsnummer, major: 1  
Giltig fr o m: 2023-03-29

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**