



Dimetikon utvärtes

(ex Linicin) lösning/spraygel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Dimetikoninnehållande lusmedel:
Spraygel (Hedrin Once)
Lösning (Linicin 15 min Solution)

ADMINISTRERING

Kutant: Ska användas i hårbotten hos alla i familjen där levande löss hittats.

Två behandlingsomgångar med ca en veckas mellanrum rekommenderas.

Läs noga på produktens bipacksedel hur behandlingen ska genomföras, då detta skiljer mellan produkterna.

Luskamma noga två gånger per vecka i två veckor efter avslutad behandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dimetikon (medicinteknisk produkt)

Lösning för hårbotten

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Huvudlöss

Dimetikoninnehållande lusmedel kan användas från 6 mån ålder.

De olika produkterna ska hanteras på lite olika sätt, läs på respektive förpackning.

ÖVRIG INFORMATION

Medicintekniska produkter innehållande dimetikon är förstahandsval vid behandling av huvudlöss.

Vanligaste biverkningarna är lokal hud- och ögonirritation.

REFERENS/LÄNK

Internetadress Hedrin - behandling mot löss och ägg

<https://hedrin.se/>

Internetadress Linicin, lusmedel

<https://www.linicin.se/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation, Behandling vid angrepp av huvudlöss

www.lakemedelsverket.se/huvudloss

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4940

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-10-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT