



Etosuximid oralt 50 mg/mL

(ex Suxinutin) oral lösning

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Etosuximid oralt 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL
7,5 mg/kg	-	0,75 mL	1,5 mL	7,5 mL
12,5 mg/kg	-	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Etosuximid (registrerad produkt)

50 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnneurolog.

Epilepsi, framför allt absenser

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 5 - 7,5 mg/kg x 2

Därefter veckovis upptitrering till symtomkontroll.

Vanlig underhållsdos: 10 - 12,5 mg/kg x 2

Maxdos 40 mg/kg/DYGN eller 1,5 gram/DYGN. Högre doser kan behövas till vissa patienter.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi

Läkemedelsverket SPC Suxinutin oral lösning

<https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=19631018000089&type=product>

PubMed PMID Brigo F, Igwe SC. Cochrane Database Syst. Rev 2017. Ethosuximide, sodium valproate or lamotrigine for absence seizures in children and adolescents.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28195639>

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-10-27

ePedID: 4947

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-10-28

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-10-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT