



## Etosuximid oralt 50 mg/mL

(ex Suxinutin) oral lösning

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

### RIMLIG DOS för Etosuximid oralt 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL
7,5 mg/kg	-	0,75 mL	1,5 mL	7,5 mL
12,5 mg/kg	-	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Etosuximid (registrerad produkt)

50 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnneurolog.

#### Epilepsi, framför allt absenser

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 5 - 7,5 mg/kg x 2

Därefter veckovis upptitrering till symtomkontroll.

Vanlig underhållsdos är 10 - 12,5 mg/kg x 2. Maxdos 40 mg/kg/dygn eller 1,5 g/dygn.

Högre doser kan behövas till vissa patienter.

### ÖVRIG INFORMATION

Etosuximid finns även som kapsel 250 mg (licensläkemedel), se annan instruktion.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Epilepsi

[https://lv.se/behandling\\_epilepsi](https://lv.se/behandling_epilepsi)

Läkemedelsverket SPC Suxinutin oral lösning

<https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=19631018000089&type=product>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-11-27

ePedID: 4947

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-11-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-11-27

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**