



Losartan oralt 10 mg/mL

(Extempore) oral suspension

Vid dehydrering/hypovolemi bör losartan tillfälligt pausas, se Övrig information.

INGEN SPÄDNING

ORAL SUSP
10 mg/mL
250 mL

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för losartan oral suspension 10 mg/mL

	20 kg	30 kg	50 kg
0,7 mg/kg	1,4 mL	2,1 mL	3,5 mL
1,4 mg/kg	2,8 mL	4,2 mL	7 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

losartan (extempore)

10 mg/mL, Oral suspension

Förvaras i rumstemperatur. Hållbar i 28 dagar från tillverkningsdatum.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

Hypertoni

Barn 6 - 18 år: Startdos 0,7 mg/kg x 1 - 2, max 50 mg/DOS
Max 1,4 mg/kg/DYGN, dock max 100 mg/DYGN

Exempel STARTdosering (fast dosering)

Barn 18 - 34 kg: 12,5 mg x 1 (1,25 mL)
Barn 35 - 49 kg: 25 mg x 1 (2,5 mL)
Barn från 50 kg: 50 mg x 1 (5 mL)

ÖVRIG INFORMATION

Losartan tillhör gruppen renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad (RAAS blockad) och kan även benämnas som Angiotensin II-hämmare (ARB).

Losartan är kontraindicerat under graviditet då det kan ge njurskada på fostret sent i graviditeten. Det finns en ökad risk för njurskada om läkemedlet ges till prematurfödda barn.

Vid dehydrering eller hypovolemi bör behandlingen med losartan pausas på grund av ökad risk till förvärrad njursvikt och hyperkalemi.

Behandling med losartan är värdefull även vid avancerad njursvikt, runtinmässig dossänkning eller utsättning rekommenderas inte. Dock bör behandlingseffekten och biverkningar regelbundet följas upp.



Losartan oralt 10 mg/mL

(Extempore) oral suspension



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827377>

PubMed PMID Lurbe et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467768>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4955

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-09-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT