



Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1, 3: spädning från Adrenalin Martindale 0,1 mg/mL

Alt. 2, 4: spädning från Adrenalin 1 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 1 - spädning från 0,1 mg/mL

Adrenalin MARTINDALE		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INF
0,1 mg/mL	+	mg/mL	=	20 mikrog/mL
10 mL		40 mL		50 mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2 - spädning från 1 mg/mL

Adrenalin		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INF
1 mg/mL	+	mg/mL	=	20 mikrog/mL
1 mL		49 mL		50 mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 3 - spädning från 0,1 mg/mL

Adrenalin MARTINDALE		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INF
0,1 mg/mL	+	mg/mL	=	20 mikrog/mL
20 mL		80 mL		100 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypotension

Nyfödda: 0,02 - 0,5 (- 1) mikrog/kg/min

Barn 1 mån - 18 år: 0,02 - 0,5 (- 1) mikrog/kg/min

Börja på 0,1 mikrog/kg/min och justera till önskad effekt.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Micromedex

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-12-13

ePedID: 4958

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 4 - spädning från 1 mg/mL

Adrenalin		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INF
1 mg/mL	+	mg/mL	=	20 mikrog/mL
2 mL		98 mL		100 mL

Beredningsinstruktion:

Infusionspåsar/flaskor i plast är överfulla. Överfyllnadsvolymer skiljer sig mellan olika tillverkare och förpackningar. Slutkoncentrationen i en 100 mL påse/flaska blir ca 18 - 20 mikrog/mL.

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig): i central infart

RIMLIG DOS för Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,02 mikrog/kg/min	0,06 mL/tim	0,3 mL/tim	0,6 mL/tim	3 mL/tim
0,1 mikrog/kg/min	0,3 mL/tim	1,5 mL/tim	3 mL/tim	15 mL/tim
0,5 mikrog/kg/min	1,5 mL/tim	7,5 mL/tim	15 mL/tim	75 mL/tim





Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adrenalin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull ska kasseras. Adrenalin Mylan ska förvaras vid 2 - 8 °C. Hållbar 12 mån i högst 25 °C. Adrenalin Bradex ska förvaras i högst 25 °C.

20 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

Adrenalin MARTINDALE (registrerad produkt)

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Bruten ampull ska kasseras.