



Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL

(ex Targocid)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt 1: Spädning från 200 mg

Alt 2: Spädning från 400 mg

EN-STEGSSPÄDNING

Alt 1:

Targocid		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
200 mg	+		=	100 mg/mL
1 st		2,1 mL		2,1 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt 2:

Targocid		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
400 mg	+		=	100 mg/mL
1 st		4,3 mL		4,3 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt sterilt vatten långsamt och lös upp pulvret försiktigt. Om det bildas skum bör lösningen stå i cirka 15 minuter.

Från vissa tillverkare medföljer sterilt vatten.

Flaskan är överfylld med pulver och därför blir den beredda lösningens koncentration 100 mg/mL efter tillsatts av 2,1 resp 4,3 mL sterilt vatten.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allvarliga grampositiva infektioner inklusive endokardit samt infektioner orsakade av Staphylococcus aureus.

Ordineras i samråd med infektionsspecialist.

Nyfödda

Laddningsdos: 16 mg/kg

Underhållsdos: 8 mg/kg x 1

Barn över 1 mån - 12 år

Laddningsdos: 10 mg/kg, var 12:e timme, max 400 mg. Ge 3 doser, sedan underhållsdos

Underhållsdos: 6 - 10 mg/kg x 1, max 400 mg

Barn 13 - 18 år

Laddningsdos: 400 - 800 mg, var 12:e timme, upprepas 3 - 5 gånger

Underhållsdos: 6 - 12 mg/kg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Doseringen bör anpassas efter njurfunktionen.

I produktresumen för Targocid anges att pulvret ska lösas i 3,14 eller 3,2 mL sterilt vatten. I denna beredningsinstruktion har vi valt att ange andra volymer än vad som står i produktresumen för att erhålla en lätthanterlig slutkoncentration både när man späder från 200 och 400 mg.

Vid underhållsbehandling bör kontroll av dalkoncentrationer av teikoplanin i serum utföras minst en gång per vecka.





Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL

(ex Targocid)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Om teikoplanin ska ges som infusion ska ordinerad dos av det upplösta pulvret spädas vidare med natriumklorid 9 mg/mL eller glukos 50 mg/mL.

Intravenös injektion: Ges som långsam injektion under 3 - 5 minuter. Till nyfödda bör teikoplanin ges som infusion.

Allvarliga livshotande överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Om läkemedlet ges som intravenös infusion minskar risken för allergiska reaktioner.

Intravenös infusion: Ges under 30 minuter.

RIMLIG DOS för Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
6 mg/kg	0,06 mL	0,3 mL	0,6 mL	3 mL
8 mg/kg	0,08 mL	0,4 mL	0,8 mL	4 mL
10 mg/kg	-	-	1 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Targocid (registrerad produkt)

100 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: färdigberedd injektionslösning och spädd infusionslösning 24 timmar i kylskåp.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Teicoplanin Sandoz

<https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20110405000025&type=product>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-01-14

ePedID: 4962

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-01-16

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT