



Talidomid oralt 50 mg

(Thalidomide BMS) kapsel

Stark teratogent, se Arbetsmiljö och Övrig information.

ARBETSMILJÖ

Potentiellt fosterskadande och/eller cancerframkallande, hantera enligt lokal rutin. Följ lokala rutiner för hantering och manipulering av talidomid, gäller både fertila kvinnor och män.

ADMINISTRERING

Vid sväljningssvårigheter eller om en lägre dos än 50 mg behövs kan kapslarna öppnas och den ordinerade dosen blandas, i första hand med vatten och undantagsvis med en sked mat (t ex sylt, yoghurt). All hantering ska ske inuti en plastpåse om tillgång till dragskåp saknas. Personer som hanterar talidomid uppmanas att ha på sig skyddsutrustning enligt lokal rutin vid hantering av anticancerläkemedel.

Talidomid tas med fördel till natten, helst på tom mage. Om patienten har känslig mage kan talidomid tas i samband med mat.

Oralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Thalidomide (registrerad produkt)

Kapsel, mjuk

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Medulloblastom

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 1, max 200 mg/DYGN

Diffusa tumörer i hjärnstammen samt i talamus

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 1 mg/kg x 1 - 2

Vid behov kan dygnsdosen titreras upp med 1 mg/kg/DYGN och VECKA.

Max 6 mg/kg/DYGN

Inflammatorisk tarmsjukdom (ej förstahandsval)

Barn 1 - 18 år: 1,5 - 2 mg/kg x 1

Systemisk juvenil idiopatisk artrit (ej förstahandsval)

Barn 3 - 18 år: Initialt 2 mg/kg x 1

Vid behov kan dosen ökas VARANNAN vecka till 3 - 5 mg/kg x 1.

Kutant erythema nodosum leprosum - Knölros (ej förstahandsval)

Barn 12 - 18 år (oavsett vikt): Initialt 100 - 300 mg x 1, max 400 mg/DYGN.

För barn under 50 kg bör det lägre doseringsintervallet väljas.

ÖVRIG INFORMATION

Talidomid är stark teratogent och kan orsaka svåra fosterskador.

Läkemedlet ska aldrig användas av gravida samt av kvinnor och män i fertil ålder om inte alla kriterier i graviditetspreventionsprogrammet uppfylls.

Försiktighet vid hantering av talidomid, speciellt vid öppnandet av kapslar, gäller både kvinnor och män. Vårdnadshavare behöver informeras och utbildas om korrekt och säker hantering i hemmiljö.



Talidomid oralt 50 mg (Thalidomide BMS) kapsel



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NOPHO protokoll Angiocomb protokoll för diffusa βönsgliom

<https://www.nopho.net/mynopho/welcome-to-mynopho/>

Pediatric Dosage Handbook

Protokoll MEMMAT

Medulloblastoma European Multitarget Metronomic Anti-Angiogenic Trial

PubMed PMID A Phase II Trial of a Multi-Agent Oral Antiangiogenic (Metronomic) Regimen in

Children With Recurrent or Progressive Cancer

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4285784/pdf/pbc0061-0636.pdf>

PubMed PMID Antiangiogenic metronomic therapy for children with recurrent embryonal brain tumors†

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.24006>

PubMed PMID Radiation therapy and concurrent topotecan followed by maintenance triple anti-angiogenic therapy with thalidomide, etoposide, and celecoxib for pediatric diffuse intrinsic pontine glioma

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.25045>

PubMed PMID Review of thalidomide use in the pediatric population

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617013>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRAL

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 4981

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-11-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT